


**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA**  
**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**CARACTERÍSTICAS CLÍNICO - EPIDEMIOLÓGICAS DE  
LAS GESTANTES CON INFECCIONES DE TRACTO  
URINARIO POR *E. COLI* PRODUCTORAS DE BLEE  
ATENDIDAS EN EL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO  
UNANUE EN EL AÑO 2015**

**TESIS**

**PRESENTADA POR BACHILLER**

**DALMA JULIETA ARISTA VARGAS**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE  
MÉDICO CIRUJANO**

**Lima - Perú**

**2016**

## RESUMEN

**Objetivo:** Determinar las características clínico - epidemiológicas de las gestantes con infecciones del tracto urinario por *E. coli* productoras de BLEE, en el Hospital Nacional Hipólito Unanue en el año 2015.

**Material y Métodos:** Se realizó un estudio tipo observacional, descriptivo y retrospectivo. La información fue recolectada a partir de las historias clínicas mediante fichas de recolección de datos.

**Resultados: se estudiaron** Se estudió 35 gestantes con ITU por *E. coli* BLEE que representan una prevalencia del 26.3% de pacientes atendidas durante el año 2015. El intervalo de edad de 15-25 años representó un 48.6%; el 45.72% fue conviviente; el nivel socioeconómico bajo representó el 74.3%; y el 51.43% tuvo secundaria completa. El 60% de las pacientes era nulíparas. La mayor frecuencia de gestantes fueron del tercer trimestre del embarazo (37.14%). En cuanto a la sintomatología el 42.85% de las gestantes refirió presentar disuria y un 31.41% presentó polaquiuria.

**Conclusiones:** La ITU por *E. coli* BLEE fue más frecuente en el intervalo de edad de 15 a 25 años y nivel socioeconómico bajo. Las gestantes fueron nulíparas del tercer trimestre de la gestación. La sintomatología más frecuente fue la disuria y la polaquiruria.

### **PALABRAS CLAVES:**

Características epidemiológicas, infección urinaria, *Escherichia coli*, resistencia microbiana, betalactamasas espectro extendido(BLEE).