

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**FACTORES DE RIESGO MATERNO PERINATAL QUE
INFLUYEN EN EL APGAR BAJO EN RECIEN
NACIDOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL HIPOLITO
UNANUE PERIODO 2014**

TESIS

PRESENTADO POR BACHILLER

RICHARD AYALA PALOMINO

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE

MÉDICO CIRUJANO

LIMA – PERU

2016

RESUMEN

Objetivo: Identificar los factores de riesgo materno y perinatal que influyen en Apgar bajo en recién nacidos atendidos en el Hospital Hipólito Unanue durante el periodo 2014.

Materiales y Métodos: Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo. Se incluyeron 126 parturientas que tuvieron su recién nacido con puntuación de Apgar menor a 7.

Resultados: La edad promedio fue de $25,5 \pm 7,8$ años. Correspondieron a adolescentes el 29,1% y añosas en 20,4%. Tuvieron periodo intergenésico largo en 24,7%. La mayoría fueron multíparas con 50,5% y sin control prenatal en 13,6%. Preeclampsia 8.3%. Anemia 26.5%. Presentaron rotura prematura de membranas en 54,4%. En el intraparto hipodinamia en 26,9%; dilatación estacionaria en 3,4%; expulsivo prolongado en 4,5%. Tuvieron bajo peso al nacer < 2500 g en 12,4% y > 4000g en 14,6%. Apgar bajo al primer minuto ≤ 3 fue 38,2% y a los 5 minutos ≤ 3 en 7,9%; y puntuación de Apgar entre 4 a 6 al 1er minuto fue de 61,8% y a los 5 minutos fue de 92,1%. Hallazgo de circular de cordón fue en 47,2% y presencia de meconio en 52,8%. Tuvieron parto vaginal en 67,4% y cesárea en 32,6%.

Conclusión: Los factores que influyeron negativamente fueron, multiparidad, sin control prenatal, preeclampsia, anemia, hipodinamia uterina, circular de cordón, meconio, pretérmino y bajo peso al nacer.

Palabras clave: Recién nacido; Apgar bajo al nacer; Factores de riesgo materno perinatal (fuente: DeCS BIREME).