

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL DESARROLLO
DE CANCER DE CUELLO UTERINO EN MUJERES
ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE GINECOLOGIA DEL
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA, DURANTE
EL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2015. LIMA –PERÚ**

TESIS

PRESENTADA POR BACHILLER

PATRICIA NATALY BUSTAMANTE ASPAJO

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
MEDICO CIRUJANO**

LIMA – PERÚ

2016

RESUMEN

Factores de riesgo conocidos asociados al desarrollo de cáncer de cuello uterino en mujeres atendidas en el servicio de ginecología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, durante del periodo de enero-diciembre 2015. Lima Perú

Objetivo: Determinar los factores de riesgo conocidos asociados al desarrollo de cáncer de cuello uterino en mujeres atendidas en el servicio de ginecología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, durante el periodo Enero-Diciembre 2015.

Metodología: El presente trabajo de investigación es un estudio descriptivo retrospectivo. Se contó con una población de 30 pacientes mujeres con el diagnóstico de cáncer de cuello uterino que se atendieron en el servicio de ginecología del Hospital Nacional arzobispo Loayza durante el periodo de enero a diciembre del 2015 .Toda la información fue captada mediante una ficha de recolección de datos obtenida de estudios previos y revisada por los asesores del estudio. Resultados: el 90% de las pacientes tuvieron su primera relación sexual en una edad menor de 18 años, 40.3% de las pacientes con diagnóstico de cáncer de cuello uterino tuvieron 4 parejas sexuales, el 30% de las pacientes tuvieron 3 gestaciones, un 26.7% 4 gestaciones, un 23.3% 5 gestaciones, un 6.7% presento 7 gestaciones y un 6.6% tuvieron entre 7 a 9 gestaciones, el 57% de las pacientes con cáncer de cuello uterino presento ITS , un 70% de las pacientes con cáncer de cuello uterino no utilizaba ningún

método anticonceptivo, solo un 7% de las pacientes utilizo métodos de barrera.

Palabras clave: factores de riesgo, cáncer de cuello uterino.