

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN
BAUTISTA**

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

**ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA
HUMANA**



**FACTORES ASOCIADOS EN PACIENTES CON
RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS
PRETERMINO QUE INGRESAN AL SERVICIO DE
GINECOLOGIA DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES
CARRIÓN DE ENERO – SETIEMBRE DEL 2015
LIMA – PERÚ**

TESIS

**PRESENTADO POR BACHILLER
ALEJANDRO ZENÓN CHÁVEZ QUIROGA**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
MÉDICO CIRUJANO**

**LIMA – PERÚ
2016**

RESUMEN

Objetivo: El presente trabajo tiene como finalidad estudiar los factores asociados a ruptura prematura de membranas pretérmino y que es un problema de salud pública de importancia clínica y epidemiológica a nivel mundial debido a las complicaciones maternas perinatales.

Material: Este trabajo se realizó desde el 1 de enero al 30 de setiembre del 2015 en el servicio de ginecología del hospital Daniel Alcides Carrión, se utilizó para la recolección de datos una encuesta y las historias clínicas de las pacientes con diagnóstico de ruptura prematura de membranas pretermo.

Métodos: El presente estudio es de tipo descriptivo, prospectivo cuyo objetivo es investigar los factores asociados para ruptura prematura de membranas pretérmino en pacientes que ingresan al servicio de ginecología del hospital Daniel Alcides Carrión en el periodo de enero a setiembre del año 2015. En el cual se estudiaron 118 gestantes.

Conclusiones: Encontrándose como principal factor asociado de ruptura prematura de membranas pretérmino a las infecciones cérvico vaginales en un 75% considerado como principal factor predisponente en nuestra investigación. Se comprobó que las pacientes con diagnóstico de ruptura prematura de membranas pretérmino cursan con mayor predominio entre las 34-37 semanas de gestación. También se evidenció que la ruptura prematura de membranas pretérmino en las pacientes fue en la edad entre 22 – 28 años.

Recomendaciones: Brindar información acerca de las consecuencias de las infecciones cérvico vaginales durante el embarazo dando a conocer las medidas de prevención. Se recomienda fomentar a las pacientes gestantes un mayor control durante las 34 -37 semanas de gestación ya que hay predominio de esta condición durante este periodo. Educar y concientizar a las gestantes acerca de la importancia de los controles prenatales durante el embarazo para así detectar de una forma oportuna los factores asociados para esta condición.