

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



FACTORES DETERMINANTES PARA
PREECLAMPSIA EN GESTANTES ADOLESCENTES
DEL DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA EN
EL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE DE
ENERO A DICIEMBRE DEL 2016

TESIS

PRESENTADA POR BACHILLER
JHONNY ISRAEL MAMANI VERA

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
MÉDICO CIRUJANO

LIMA – PERÚ

2017

RESUMEN

La preeclampsia sigue siendo la patología más preocupante del tercer trimestre de la gravidez, ésta patología de etiología aún desconocida asociada a factores múltiples de determinantes, constituyendo una de las principales preocupaciones en la Salud pública de nuestro país, cobrando grandes consecuencias en la especialidad obstétrica-perinatal⁽¹⁾.

En nuestro país sigue siendo la segunda causa de morbilidad materna perinatal y es la primera causa de mortalidad en los nosocomios⁽²⁾.

Objetivo: Identificar los Factores Determinantes para preeclampsia en gestantes adolescentes del Departamento de Gineco-Obstetricia del HNHU de Enero - Diciembre del 2016.

Material y Método: Se estudiaron un total de 203 madres adolescentes con diagnóstico de Preeclampsia, Enero a Diciembre del 2016 en un estudio retrospectivo, descriptivo, observacional, mediante nuestra ficha de recolección de datos, que fueron tomados de la Historia Clínica en el HNHU.

Resultados: El 21,7% de las gestantes con preeclampsia son adolescentes tempranas. El 78,3% son adolescente tardía. El 85,7% de las gestantes con preeclampsia fueron Nulíparas. El 14,3% de las gestantes con Preeclampsia fueron multíparas. El 44,8% de las gestantes con preeclampsia tuvieron menos de 6 Controles prenatales y el 56.2% tuvieron más de 6 Controles prenatales.

El 73.4% de las gestantes con preeclampsia estudiaron primaria. El 7,9 % estudiaron el nivel secundario, el 15.8% estudiaron nivel técnico y el 3 % al

nivel superior. El 81.3 % de las gestantes con preeclampsia son amas de casa. El 10,8 % de las gestantes con preeclampsia son estudiantes y el 7.9 son empleadas.

Palabras claves: adolescente, factores de Determinantes preeclampsia.