

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**CARACTERÍSTICAS DE LAS INFECCIONES
PUERPERALES EN PACIENTES OBSTÉTRICAS
ATENDIDAS POR PARTO EUTÓCICO EN EL
HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE
PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016
TESIS**

**PRESENTADA POR BACHILLER
JUDITH ANGELA JIMENEZ CHILINGANO
PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
MÉDICO CIRUJANO**

LIMA – PERÚ

-2017-

RESUMEN

OBJETIVO: Fijar los detalles de la patología infecciosa en pacientes puérperas que recibieron atención por parto eutócico, en el Hospital Hipólito Unanue, en el lapso Enero - Diciembre 2016.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se efectuó una investigación retrospectiva, cualitativa, sobre las particularidades del proceso infeccioso puerperal en pacientes obstétricas, quienes recibieron atención por parto normal, en el Hospital Hipólito Unanue. Mediante la aplicación de una lista de chequeo se obtuvo la información de 60 pacientes obstétricas con sus respectivas historias clínicas, todas de parto eutócico que presentaron infección puerperal. Se realizó también la investigación detallada de las variables.

RESULTADOS: Los estudios realizados revelaron que la generalidad de infecciones puerperales estuvieron entre las edades de 36 – 40 años con un 38%; el 45% convivientes, el 58% de los procesos infecciosos puerperales correspondían a amas de casa y, un 47% fueron primigestas. En cuanto a las embarazadas, el 90% con infección puerperal no recibieron controles prenatales adecuados, un 25% con anemia. En lo referente al parto, un 20% con labor de parto prolongado, En cuanto a las características de la atención del parto se encontró: El 57 % presentó tactos vaginales (más de cuatro tactos vaginales), en el transcurso del trabajo de parto, al 25% de pacientes se les realizó revisión manual de la cavidad uterina, un 15% tuvo alumbramiento prolongado.

CONCLUSIONES: De acuerdo a los resultados obtenidos, se muestra, que al realizarse tactos vaginales frecuentes, el no haberse realizado controles prenatales adecuados y, presentar anemia, conllevan a tener una incidencia mayor de infecciones.

Palabras clave: Características relacionadas al puerperio, infección puerperal