## UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



## **TESIS**

CARACTERÌSTICAS ANATOMOPATOLOGICAS DEL ENDOMETRIO EN PACIENTES CON HEMORRAGIA UTERINA ANORMAL ATENDIDAS EN EL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE EN ELPERIODO ENERO – JUNIO DEL 2015.

> PRESENTADO POR LA BACHILLER YOSELYN YANETH ROMANI LUYO

PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE MEDICO CIRUJANO

LIMA - PERÚ

2016

## **RESUMEN**

El objetivo fue determinar las características anatomopatológicas del endometrio en pacientes con hemorragia uterina anormal atendidas en el Hospital Nacional Hipólito Unanue en el año 2015.

Material y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo, correlacional, que se llevó acabo en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, en el período comprendido de enero a junio del2015. Se incluyó 80 pacientes que asistieron por Hemorragia uterina Anormal, se revisó el resultado anatomopatológico ya sea por biopsia con cureta, legrado uterino o estudio de pieza quirúrgica. La recolección de datos se realizó mediante la revisión del libro estadístico del Servicio de Anatomía patológico, donde se consigna toda la información requerida para el estudio, y en estadístico el procesamiento У análisis se utilizó el programaestadísticoSPSSversión18 y Excel.

**Resultados**:La edad más frecuente fue la etapa adulta (21-59 años) con un 73.75% y en etapa adulta mayor (mayores de 60 años) con un 26.25%. Nuestro estudio concluye que la Hemorragia Uterina Anormal afecta más a mujeres que comprenden entre 21 y 59 años. Se observa la prevalencia de cáncer de endometrio en pacientes post menopaúsicas es de 16.13%.

**Conclusiones**: Nuestro estudio concluyo que toda paciente que ingresa por HUA tiene mayor prevalencia de cáncer de endometrio y que es mucho mayor en pacientes postmenopaúsicas.