

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

**ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**PREVALENCIA Y CARACTERÍSTICAS DE PACIENTES CON  
RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS ENTRE LAS 22 Y  
34 SEMANAS DE EDAD GESTACIONAL EN EL HOSPITAL  
NACIONAL REZOLA DE CAÑETE, ENERO – DICIEMBRE 2015**

**TESIS**

**PRESENTADO POR BACHILLER:**

Jermy Jimmy, Saavedra Francia.

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICO  
CIRUJANO.**

Lima – Perú 2016

## RESUMEN

Según la OMS La Ruptura Prematura de Membrana es responsable del 10% de morbilidad y mortalidad neonatal en las gestaciones prematuras. La RPM es un problema que viene de muchos años atrás y aunque se lo ha conocido y se ha tratado de disminuir su incidencia no se ha logrado hacerlo. Este trabajo tiene como Determinar la prevalencia y las características de pacientes con ruptura prematura de membranas entre las 22 y 34 semanas de edad gestacional en el Hospital Nacional Rezola de Cañete.

Se realizó un estudio de enfoque cuantitativo, diseño observacional, y tipo transversal descriptivo y retrospectivo en pacientes con diagnóstico de RPM pretermino que fueron atendidas en el en el hospital Rezola de Cañete, enero – diciembre 2015.

La Prevalencia de la Ruptura Prematura Membrana entre las 22 y 34 semanas de edad gestacional y en periodo enero – diciembre del 2015 fue 17/1000 pacientes en el Hospital Rezola de Cañete. los factores de riesgo materno, conocidos en la literatura y presentes en el Hospital Rezola son antecedente Ruptura Prematura de Membranas, Edad materna menor de 20, Metrorragia, Periodo intergenésico medio, Infecciones Cervico-vaginales, Cirugía ginecológica previa, Infertilidad. Las características más frecuente en la Ruptura de Membranas Pretermino entre las 22 y 34 semanas en el en el Hospital Rezola son: alto riesgo social 42.6% (29 pacientes) y infección cervico-vaginal 38.2% (26 pacientes).

Palabras claves: Ruptura prematura de membranas, parto pretermino, prevalencia.