

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**COMPLICACIONES OBSTETRICAS ASOCIADAS A
LAS GESTANTES ADOLESCENTES Y ADULTAS
JOVENES EN EL HOSPITAL DE EMERGENCIAS
GRAU-RED ALMENARA ESSALUD, 2015**

TESIS

PRESENTADO POR BACHILLER:

DICINA CARMEN TORRES GAMBINI

**PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE
MEDICO CIRUJANO**

LIMA – PERÚ

2016

RESUMEN

Introducción: En nuestro país el embarazo en adolescentes está en aumento en los últimos 14 años aumentó, al pasar de 13,0% en el año 2000 a 14,6% en el 2014. El embarazo en la adolescente se considera como un embarazo de alto riesgo por lo que se evidencia mayor incidencia de complicaciones durante la gestación y el parto.

Materiales y Métodos: Estudio observacional retrospectivo transversal, de cohorte, toda vez que partimos del probable factor de riesgo hacia las complicaciones. Se utilizó el programa estadístico SPSS 17. En el análisis bivariado se determinó si hay asociación de la edad y con cada una de las variables de las complicaciones mediante el chi-cuadrado y en aquellas se encontró relación se calculó el riesgo relativo (RR).

Resultados: La edad adulta es factor de riesgo para presentar complicaciones siendo significativo $p=0.019$. Otros factores como paridad, control pre-natal, estado civil y antecedentes de abortos no se encontró nivel de significancia, siendo $p>0.05$. Se encontró gestantes adolescentes tardías con (61.9%) y una población menor adolescentes menores de 13 años (0.6%). El 61% de las adolescentes en nuestra población son solteras. El 92% de la población adolescente ingresó al hospital con una gestación a término. El 96% de las gestantes adolescentes tienen como antecedente respecto a la paridad ser nulíparas. El 48.9% no cumplieron con el control pre-natal. El 68% terminaron con la gestación mediante parto eutócico, mientras que el 31% terminó en cesárea.

Conclusiones: La edad adulta joven incrementa el riesgo de complicaciones en 31%. En el grupo de las adolescentes las complicaciones más frecuentes fueron RPM 11.4% seguido de TPD con 7.4%. Mayor población se observa en las gestantes adolescentes tardías a partir de 17 años con (61.9%).

Palabras claves: Embarazo Adolescente, Complicación obstétricas.