

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

**ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**FACTORES ASOCIADOS PARA DESARROLLAR  
COLECISTÉCTOMIA LAPAROSCÓPICA DIFÍCIL EN  
PACIENTES DEL SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL  
DEL HOSPITAL NACIONAL LUIS N. SÁENZ DE LA  
PNP EN EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2015**

**TESIS**

**PRESENTADO POR BACHILLER:**

**MONTERO MONTEZA CARLOS ROBERT  
PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE  
MEDICO CIRUJANO**

**LIMA – PERÚ**

**2016**

## RESUMEN

**Objetivo:** Determinar los factores asociados para desarrollar Colectomía Laparoscópica difícil en pacientes operados en el Servicio de Cirugía General del Hospital Nacional “Luis N. Sáenz” de la PNP en el periodo de enero a junio de 2015.

**Metodología:** Se desarrolló un estudio descriptivo, retrospectivo de corte transversal. Se realizó un muestreo no probabilístico, en todos los pacientes ingresados al Hospital por el servicio de Cirugía General desde el 01 de enero al 30 de junio 2015 quienes se sometieron a Colectomías Laparoscópicas. Se utilizó el paquete estadístico de Excel, con el cual se realizó todo el análisis de la información.

**Conclusiones:** Los diagnósticos de ingreso más frecuente fueron colecistitis aguda y colecistitis crónica reagudizada que en conjunto constituyen más de 70 %. En hallazgos intraoperatorios más frecuentes, fueron las múltiples adherencias con 30%, seguido de casos como variantes anatómicas 27%, vesícula plastronada 21%, siendo los factores más frecuentes en las Colectomías Laparoscópicas Difíciles

**Palabra claves:** Colectomías Laparoscópicas difícil, colecistitis