

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA



ASOCIACIÓN DE LA RECESIÓN GINGIVAL Y SUS INDICADORES DE RIESGO EN
BASE A LA CLASIFICACIÓN DE MILLER EN PACIENTES DE LA CLÍNICA
ESTOMATOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA EN
LIMA NORTE DURANTE EL SEMESTRE 2017- I

TESIS

PRESENTADA POR BACHILLER

DANIELA GIANINA AEDO CORDERO

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
CIRUJANO DENTISTA**

LIMA - PERÚ

2018

RESUMEN

Objetivo: Asociar la recesión gingival y sus indicadores de riesgo en base a la clasificación de Miller en pacientes de la clínica estomatológica Universidad Privada San Juan Bautista en Lima Norte durante el semestre 2017- I. **Materiales y métodos:** Se ejecutó un estudio descriptivo, transversal y observacional en una población de 202 pacientes mediante un muestreo probabilístico aleatorio simple, la muestra evaluada fue de 121 pacientes con un total de 810 dientes. El rango de edad fue de 20 a 45 años. El examen clínico se realizó por un único examinador calibrado, la cual a través de la clasificación de Miller evaluó las recesiones en la zona media vestibular de cada paciente, con una sonda milimétrica de 15mm (Hu-Friedy, EE.UU®). **Resultados:** En los sujetos y en las piezas dentarias fue predominante el sexo femenino, el rango de edad de 20 a 25 años y el nivel de índice de higiene oral con IHO buena. En pacientes se encontró de 1 a 5 recesiones en un 51.2%. En piezas dentarias, el biotipo gingival delgado tuvo el 69.9%, el primer premolar un 18.6%, el cuadrante inferior izquierdo un 31.9%, la clase I según Miller fue de 99% mayor sobre la clase II; el margen gingival 1mm 74.4%, la profundidad al sondaje fue de 2mm en 48.5% y el nivel de inserción 3mm un 50.7% de los más afectados. **Conclusiones:** No se encontró asociación entre la cantidad de recesiones gingivales con las variables sexo, grupo étnico e índice de higiene oral en los pacientes; ni se encontró asociación entre la severidad según Miller I y II y las variables sexo, grupo étnico, Índice de Higiene Oral, Biotipo, según el tipo de pieza dentaria, según el cuadrante, ni la profundidad; sin embargo, si hubo asociación entre la severidad según Miller I y II , y el margen gingival; y también existió asociación entre la severidad según Miller I y II con el nivel de inserción clínica.

Palabras clave: Recesión gingival, indicadores de riesgo, clasificación de Miller