

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



TRASTORNO DEPRESIVO Y CONTROL GLUCÉMICO EN
PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2
EN EL HOSPITAL NACIONAL DE ATE VITARTE DURANTE EL
PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2018

TESIS

PRESENTADA POR BACHILLER

CHUQUILLANQUI ESPINOZA ROMULO JUNIOR

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE

MÉDICO CIRUJANO

LIMA – PERÚ

2019

RESUMEN

Objetivo: Determinar si el diagnóstico de depresión en pacientes con diabetes tipo 2 propicia a un inadecuado control glucémico en el Hospital Nacional De Ate Vitarte durante el periodo de octubre-diciembre 2018 Lima Perú

Metodología: Se realizó un estudio retrospectivo, observacional, transversal, cuantitativo y correlacional

Los participantes del trabajo fueron pacientes de 30 a 60 años de edad seleccionados por muestreo aleatorio simple donde se recolectaron datos de las historias clínicas mediante una ficha de recolección de datos y se aplicó el test de Beck.

Resultados: se obtuvo de los 150 pacientes diabéticos estudiados 87 tuvieron depresión, de ellos 25.2 % tenían un adecuado control de glucemia y 74.7% un inadecuado control glucémico.

Mientras que 63 pacientes diabéticos no presentaron depresión y de ellos 55.5% presentaron un adecuado control glucémico y 44.4% un inadecuado control glucémico ($p=0.005$)

Conclusión: existe una relación entre el inadecuado control glucémico y la presencia de depresión en pacientes que padecen diabetes mellitus

Palabras claves: Diagnóstico de depresión, diabetes mellitus tipo 2, nivel glucémico