

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

**ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A PROLAPSO GENITAL EN  
MUJERES SUPERIORES A LOS 18 AÑOS DE EDAD, ATENDIDAS EN EL  
SERVICIO DE GINECOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO  
UNANUE 2019**

**TESIS**

**PRESENTADA POR BACHILLER**

**MORVELI LEONARDO SUSSY JOSELYN**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE  
MÉDICO CIRUJANO**

**LIMA-PERÚ**

**2020**

## RESUMEN

**INTRODUCCIÓN:** El prolapso genital conlleva a una variedad de inconvenientes en la salud pública por las implicaciones en contra de la salud femenina; por su variedad de consecuencias al aparato genital.

**OBJETIVO:** identificar los factores de riesgo asociados a prolapso genital en mujeres superiores a los 18 años de edad, atendida en el servicio de ginecología del Hospital Nacional Hipólito Únanue 2019.

**MATERIAL Y MÉTODOS:** Se trabajó un estudio observacional, analítico, corte transversal. La población total de mujeres con dicha patología es 371; la muestra alcanzada fue de 243 pacientes con prolapso genital siendo ellas el grupo de casos y 243 pacientes sin el diagnóstico representando los controles. Se sacaron los datos de las historias clínicas mediante la ficha de recolección de datos.

**RESULTADO:** se recabo que la edad tiene relación al prolapso genital  $p < 0.000$ , la obesidad ( $IMC > 30$ ) tiene un riesgo OR: 2.9, IC: 2.0-4.2 y  $p < 0.000$ , no se obtuvo la relación con el precedente de cirugía pélvica con  $p > 0.05$ . la multiparidad con respecto al número de partos tiene un OR: 2.74, IC: 1.9-3.9 y  $p < 0.000$ , el parto vía vaginal tiene un OR: 1.9, IC: 1.3-2.7 y  $p < 0.000$ .

**CONCLUSIONES:** Los factores de edad, obesidad, precedente de cirugía pélvica, número de partos y tipo de parto en mujeres superiores a los 18 años se relacionan altamente con el desencadenamiento del prolapso genital.

**PALABRAS CLAVE:** Prolapso Genital, factores de riesgo.