

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**RIESGOS RELACIONADOS A ATONÍA UTERINA EN PUÉRPERAS DEL
SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS
DE MAYO ENTRE EL PERÍODO 2014-2018, LIMA.**

TESIS

PRESENTADA POR BACHILLER

ÑIQUEN SALAZAR GRACIA SOL GIANELLA

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE

MÉDICO CIRUJANO

LIMA-PERÚ

2021

RESUMEN

Objetivo: Identificar los riesgos relacionados a atonía uterina en puérperas del servicio de Gineco - Obstetricia del Hospital Nacional Dos de Mayo entre el período 2014- 2018, Lima.

Materiales y Métodos: Es un estudio de tipo observacional, analítico, transversal, de caso y control, retrospectivo. La muestra con la que se contó fue de 100 puérperas que presentaron atonía uterina en el Hospital Nacional Dos de Mayo que cumplieron con los criterios de inclusión, el muestreo fue no probabilístico. La información que se recopiló se transcribió a una ficha de recolección de datos para luego ser procesada mediante el programa IBM-SPSS 0.25.

Resultados: Los riesgos relacionados a atonía uterina fueron: clínicos, epidemiológico y obstétricos. Los riesgos clínicos relacionados fueron: el 6,3% la hipertensión arterial, el 3,3 % la obesidad, el 3,3% el hipertiroidismo y el 0,8% la diabetes mellitus tipo 2. Los riesgos epidemiológicos relacionados fueron: el 20,3 % el nivel de educación secundaria, el 16,5% la edad entre 18 y 24 años, y el 16,3 % estado civil convivientes. Los riesgos obstétricos fueron: el 20,5 % el parto eutócico, el 17% el parto precipitado, 10 %, el uso de oxitócicos, el 5,8% el trabajo de parto prolongado, el 5,3% la macrosomía fetal y el 1,8% la infección intra amniótica.

Conclusiones: Los riesgos relacionados a atonía uterina fueron: clínicos, epidemiológicos y obstétricos. Destacando primero los riesgos obstétricos, seguido de los epidemiológicos y en menor porcentaje los riesgos clínicos.

Palabras claves: Riesgos, atonía uterina, puérperas.