

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA RUPTURA PREMATURA DE
MEMBRANAS EN GESTANTES DE 18 A 35 AÑOS ATENDIDAS EN EL
HOSPITAL DE HUAYCÁN ENTRE EL 2016 AL 2020.**

TESIS

PRESENTADA POR BACHILLER

OCHANTE ALVAREZ HERBERTH DIEGO

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE

MÉDICO CIRUJANO

LIMA – PERÚ

2021

RESUMEN

Objetivo: Determinar los factores de riesgo asociados a la ruptura prematura de membranas en gestantes de 18 a 35 años atendidas en el Hospital de Huaycán entre el 2016 al 2020.

Materiales y métodos: Se realizó un estudio observacional, analítico de casos y controles, retrospectivo; la muestra estuvo conformada por 165 gestantes seleccionadas mediante un muestreo probabilístico aleatorio simple. Se utilizó como instrumento una ficha de recolección de datos y se calcularon las frecuencias absolutas y relativas de todas las variables; además, para determinar el riesgo se calculó el Odds Ratio (OR).

Resultados: La muestra estuvo caracterizada por una edad promedio de 24,8 años y de procedencia urbana. Respecto a los factores sociodemográficos, no se determinó que incrementaran el riesgo de desarrollar ruptura prematura de membranas. Sin embargo, el factor gineco-obstétrico de haber tenido mayor o igual a 3 embarazos aumentó el riesgo en 2,8 veces; mientras que el factor patológico de antecedente de ruptura de membranas aumentó el riesgo en 1,4 veces.

Conclusiones: Los principales factores de riesgo para padecer una ruptura prematura de membranas fueron el número de embarazos y tener antecedente de ruptura prematura de membranas.

Palabras clave: *Ruptura prematura de membranas, factores de riesgo, factores sociodemográficos, factores gineco-obstétricos, factores patológicos*