

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**FACTORES PRONÓSTICOS ASOCIADOS A LA SOBREVIDA EN PACIENTES
CON CÁNCER DE PENE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES
NEOPLÁSICAS DURANTE EL PERIODO 2006-2016.**

TESIS

PRESENTADA POR BACHILLER

RAMÍREZ ESPINOZA MARVIN ADHEMIR

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
MÉDICO CIRUJANO**

LIMA – PERÚ

2021

RESUMEN

Objetivo: Determinar los factores pronósticos asociados a la sobrevida en pacientes con cáncer de pene atendidos en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas durante el periodo 2006-2016

Material y métodos: es un estudio observacional, retrospectivo, analítico y transversal. Mediante el estudio se quiso conocer los factores pronósticos asociados a la sobrevida en pacientes con cáncer de pene atendidos en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, mediante una base de datos secundaria, se tomó como variables para el estudio los factores clínicos y patológicos de los pacientes durante el periodo del 2006 hasta el 2016. El análisis de los resultados será procesado en el programa de IBM SPSS versión 25, para ser analizado en relación a las variables en estudio y el método a utilizar será el estimador Kaplan Meyer.

Resultados: de una población total de 497, para el análisis se obtuvo una muestra de 246. De los factores clínicos como edad, estadio clínico y comorbilidad (diabetes), para el factor edad en el estudio 246 pacientes presentaban un promedio de edad de 64 años (intervalo de 22 a 108 años), el 60.56% (196) de los pacientes estudiados presentaron edades mayores a 60 y 39,44% (301) presentaron edades menores a 60. Se obtuvo que el estadio clínico II y comorbilidad (diabetes) para el estudio fue significativo como factor pronóstico de sobrevida en los pacientes con cáncer de pene.

Dentro la variable patológica trabajada en mi estudio resulto que el tipo histológico, el diámetro de la lesión y la presencia de ganglios para mi población en estudio no fueron significativas, no hallándose dentro de los factores que influyen en la sobrevida de los pacientes con cáncer de pene del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.

Conclusiones: Se concluye que los factores pronósticos asociados a la sobrevida en pacientes con cáncer de pene en mi estudio de investigación en su gran mayoría no están asociados a la sobrevida debido posiblemente a que los datos de los pacientes con cáncer de pene no se encontraba completa, solo encontrándose como factor que interviene en el tiempo de supervivencia al estadio clínico II y la comorbilidad (diabetes).

Palabra clave: sobrevida, cáncer de pene, estadio clínico, diagnostico histopatológico.