

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS ASOCIADOS AL ABORTO
INCOMPLETO EN MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE
EMERGENCIAS GINECO-OBSTÉTRICAS DEL HOSPITAL DE VITARTE
EN EL PERÍODO 2019.**

TESIS

PRESENTADO POR BACHILLER

RICHARD LORENZO BLAS CORONEL

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE

MÉDICO CIRUJANO

LIMA – PERÚ

2021

RESUMEN

Objetivo: Conocer la asociación entre los factores sociodemográficos y la ocurrencia del aborto incompleto en mujeres atendidas en el servicio de emergencias Gineco-Obstétricas del Hospital de Vitarte en el período 2019.

Materiales y métodos: El estudio es de tipo no experimental, transversal, retrospectivo, analítico tipo casos y controles. La muestra estuvo conformada por 411 pacientes divididas en 137 casos y 274 controles, todas atendidas en el servicio de emergencias gineco-obstétricas en el periodo 2019, de las cuales se recogieron datos a través de una ficha de recolección de datos previamente elaborada y revisada por expertos, toda la información obtenida se subió a una plantilla Excel, posteriormente exportada al software SPSS versión 21.0 y se usó la prueba de chi cuadrado y risk factor para el análisis respectivo.

Resultados: Se estableció asociación significativa entre los factores sociodemográficos y el aborto incompleto, para nivel educativo ($p=0,045$) y para ocupación ($0,035$). se determinó los siguientes factores de riesgo: tener solo primaria completa o secundaria incompleta (OR: 1,529 IC 95% 1,008-2,320), no tener trabajo (OR: 1,568 IC 95% 1,030-2,385).

Conclusiones: El tener solo primaria completa o secundaria completa aumenta en 1.5 el riesgo de tener aborto y no tener trabajo, aumenta en 1.6 el riesgo de tener aborto, considerando a ambos factores sociodemográficos de riesgo.

Palabras clave: Aborto, aborto incompleto, factores sociodemográficos, historias clínicas, ginecología y obstetricia.