

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**SÍNTOMAS DE REFLUJO GASTROESOFÁGICO EN PACIENTES
SOMETIDOS A CIRUGÍA BARIÁTRICA DE DETECTA CLÍNICA DURANTE
EL PERÍODO DEL 2020**

TESIS

PRESENTADA POR BACHILLER

KARIN ELENA FUSTER JANAMPA

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE

MEDICO CIRUJANO

LIMA – PERÚ

2021

RESUMEN

Objetivo: Determinar el síntoma más frecuente de reflujo gastroesofágico en pacientes sometidos a cirugía bariátrica de Detecta Clínica durante el periodo del 2020. Materiales y métodos: Básica, retrospectiva, transversal, observacional. Con una población de 208 individuos. Se utilizó una ficha de recolección de datos. Resultados: Se encontró que el síntoma más frecuente fue pirosis (38.7%), los que presentaron mayor frecuencia de reflujo según edad fueron los de 36 a 55 años (50.6%), sexo femenino (58.1%), según comorbilidades la mayoría presento diabetes (31.9%), de acuerdo a las características clínicas, presentaron antecedente de ERGE (86.3%), tiempo post cirugía menor a 1 mes (55.6%) y el tipo de técnica quirúrgica Gastrectomía en manga laparoscópica (60.6%). Se puede concluir que el síntoma más frecuente en los pacientes que presentaron reflujo gastroesofágico por cirugía bariátrica fue pirosis, mayor frecuencia en el sexo femenino, de 36 a 55 años, también presentaron diabetes, antecedentes de ERGE, tiempo de cirugía menor a 1 mes y la técnica quirúrgica con mayor frecuencia de reflujo fue la gastrectomía en manga laparoscópica.

Palabras clave: reflujo, cirugía bariátrica, síntomas