

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y PATOLOGÍAS
DUALES EN PACIENTES PSIQUIÁTRICOS TRATADOS EN EL
CENTRO DE REHABILITACIÓN "AYUDÉMONOS" 2017 - 2020**

TESIS

PRESENTADA POR BACHILLER

COLOMA ÑAVINCOPA JOSE MARTIN

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE

MÉDICO CIRUJANO

LIMA-PERÚ

2022

RESUMEN

Objetivo: Determinar el consumo de sustancias psicoactivas y las patologías duales en pacientes atendidos en el centro de rehabilitación "Ayudémonos" 2015-2019

Metodología: estudio descriptivo, de enfoque cuantitativo, de corte transversal, de nivel descriptivo, en una población de 103 pacientes.

Resultados: Los pacientes se encuentra en el rango de 18-25 años con 47,57%, 26-45 con 39,80% y de 46-65 con 12,62%. El género masculino con 76,64%, femenino con 23,38%. Estados separados con 40,37% soltero 33,98%, y casados con 25,24%. Estudios superiores con 54,36% secundaria con 36,89% y primaria con 8,73%. Ocupación empleados con 54,36% estudiantes con 34,95% y amas de casa con 17,47%. Viven con los padres con 39,80%, conviven con la pareja con 36,89% y viven solos con 23,30% . La bipolaridad con 41,74%, Trastorno obsesivo compulsivo (TOC) con 26,31% (27); esquizofrenia con 23,30% (24); y el trastorno esquizoafectivo con 10,67% (11). Consumen drogas entre 2-4 años con 45,63% (47); mas de 5 años con 28,15% (29); y menos de un año con 26,21% (27). Consumo de drogas antes de los 18 años 78,64% (81); y después de los 18 años un 21,35% (22). La droga mas consumida es pasta básica de cocaína asociada a alcohol con 65,04% (49); clorhidrato de cocaína con 23,30% (23); y la marihuana con 12,62% (13). Terapias previas en el rango de 0 a 1 un 44,66% (46), de 2 a 3 terapias un 30,09% y a mas de 3 terapias un 25,24%.

Conclusiones: Pacientes entre 18-25 años, masculinos, separados, educación superior, empleados, viven con sus padres, son bipolares, consumen drogas mas de 2 años, empezaron antes de los 18 años, pasta básica de cocaína y era su primera terapia

Palabras claves: Patología dual, sustancias psicoactivas.