UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA

FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS, MATERNO PERINATALES RELACIONADOS A LA MORTALIDAD NEONATAL EN EL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION ENTRE LOS AÑOS 2017 A 2019

PRESENTADO POR BACHILLER

ARTEAGA DE LA PUENTE, KARINA ANDREA

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE

MÉDICO CIRUJANO

LIMA – PERÚ

2022

RESUMEN

Objetivo: Determinar los factores materno perinatales relacionados a la mortalidad neonatal en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión entre los años 2017 a 2019

Metodología: descriptivo-correlacional, retrospectivo, transversal, de enfoque cuantitativo. Población de 126 neonatos fallecidos en Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión entre los años 2017 a 2019

Resultados: La RPM tiene Chi2 4,35 con p<0,037; la edad gestacional menor de 35 semanas con Chi2 5,072 y p<0.002; el bajo al nacer con Chi2 4,22 y p<0,002; la enfermedad de membrana hialina con Chi2 2,97 y p<0.010; as malformaciones congénitas con Chi2 1,82 y p<0.03 y la sepsis neonatal con Chi2 3,38,y p<0,016 están relacionada a la mortalidad neonatal.

Conclusiones: Los factores maternos perinatales relacionados a la mortalidad neonatal son ruptura prematura de membrana (RPM), la poca edad gestacional, el bajo peso al nacer, la enfermedad de membrana hialina, las malformaciones congénitas y la sepsis neonata.

Palabras claves: mortalidad neonatal, factores maternos, factores neonatales