

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

**ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A PROLAPSO GENITAL EN  
MUJERES MAYORES DE 60 AÑOS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE  
GINECOLOGIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA DURANTE EL  
PERIODO NOVIEMBRE 2017- OCTUBRE 2018**

**TESIS**

**PRESENTADA POR BACHILLER**

**BRUNO ALVA CARMEN JESÚS**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE  
MÉDICO CIRUJANO**

**LIMA – PERÚ**

**2022**

## RESUMEN

**Objetivo:** Determinar los factores de riesgo asociados a prolapso genital en mujeres mayores de 60 años atendidas en el servicio de ginecología del Hospital María Auxiliadora durante el periodo Noviembre 2017-Octubre 2018

**Materiales y métodos:** observacional, retrospectivo, transversal, analítico, caso-control, por medio de una ficha de recolección de datos confeccionada para recoger la información necesaria. Por medio de tamaño muestra por cálculo estadístico para caso-control, se recolectó 154 historias clínicas (77 HC de mujeres mayores de 60 años con prolapso genital y 77 HC de mujeres mayores de 60 años sin prolapso genital).

**Resultados:** Del total de historias clínicas revisadas; sobre la edad avanzada el 71,4% de mujeres entre 60-69 años no presentó prolapso genital, y el 32,5% de mujeres entre 70-79 años sí presentó prolapso genital. Chi cuadrado  $p=0.6$  ( $p=0.05$ ) OR=0,832 (IC 95%; 0,419- 1,654. Sobre la paridad, el 67,5% de multíparas no presentó prolapso genital, mientras que en las gran multíparas el 58,4% sí presentó prolapso genital. Chi cuadrado  $p=0.001$ , OR=0,342 (IC 95%; 0,177- 0,660). Sobre tipo de parto el 89,6% de mujeres con antecedente de parto vaginal presentó prolapso genital, mientras que el 31,2% de mujeres con antecedente de haber sido cesareadas no presentó prolapso genital. Chi cuadrado  $p=0.001$ , OR=3,906 (IC 95%; 1,626- 9,384). Respecto a la obesidad, el 63,6% de mujeres obesas sí presentó prolapso genital, mientras que el 70,1% de mujeres no obesas no presentó prolapso genital; Chi cuadrado  $p=0.000$ , OR=4,109 (IC 95%; 2,095- 8,058).

**Conclusiones:** La edad avanzada no es un factor de riesgo de prolapso genital; mientras que el tipo de parto y la obesidad sí lo son. Y además también se determinó que la paridad es un factor protector de prolapso genital.

**Palabras Clave:** prolapso genital, factores de riesgo, edad avanzada, paridad, tipo de parto, obesidad.