

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**FACTORES DE RIESGOS MATERNOS ASOCIADOS A ABORTO
ESPONTÁNEO EN PACIENTES DEL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y
OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REZOLA CAÑETE 2021**

TESIS

PRESENTADO POR BACHILLER

GUERRA MANRIQUE SANDRA NOELIA

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE

MÉDICO CIRUJANO

LIMA-PERÚ

2022

RESUMEN

Objetivo: Determinar los factores de riesgos maternos asociados al aborto espontáneo en pacientes del servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Rezola Cañete en el 2021. **Materiales y métodos:** esta investigación fue de tipo; observacional, analítico, retrospectivo, de corte trasversal, tipo casos y controles. La muestra estuvo conformada por 93 casos y 93 controles, obtenidos a través del programa EPIDAT, se utilizó los programas Microsoft Excel para la base de datos y SPSS versión 26 para el análisis. **Resultados:** Se encontró asociación entre edad ($p=0.000$) y grado de instrucción ($p=0.005$) con aborto espontáneo, se puede observar que los pacientes tienen una edad mayor a 35 años pacientes y grado de instrucción más frecuente secundaria. Además, se determinó asociación con la alteración anatómica del aparato reproductor femenino (0.000) y el aborto espontáneo. Finalmente, se halló que aborto previo ($p=0.000$) e ITU ($p=0.000$) tiene relación significativa con el aborto espontáneo. **Conclusión:** Los factores sociodemográficos asociados con mayor frecuencia a aborto espontáneo, fueron la edad y el grado de instrucción, dentro del factor ginecológico asociado con mayor frecuencia al aborto espontáneo fue la alteración anatómica del aparato reproductor femenino y los factores obstétricos asociados con mayor frecuencia fueron el aborto previo e infecciones del tracto urinario.

Palabras claves: aborto espontáneo, factores sociodemográficos, factores ginecológicos, factores obstétricos.