

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA PREECLAMPSIA EN
GESTANTES DEL HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA
VEGA DURANTE EL AÑO 2019 y 2020**

TESIS

PRESENTADA POR BACHILLER

SALAZAR SOTO CLARELYNN DIXIE

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE

MÉDICO CIRUJANO

LIMA-PERÚ

2022

RESUMEN

OBJETIVO: El objetivo del estudio fue determinar los factores de riesgo asociados a la preeclampsia en gestantes del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega durante el año 2019 y 2020.

MÉTODOS Y MATERIALES: Se llevó a cabo un estudio de tipo observacional, analítico, transversal, retrospectivo de casos y controles no emparejado, basado en un Hospital Regional, que incluyó a 116 pacientes divididos en 58 casos y 58 controles en Abancay, Apurímac, durante el año 2019 y 2020. Se aplicó un instrumento para recopilar datos de los archivos médicos. Las asociaciones se determinaron mediante la prueba de Chi-cuadrado reportada por el valor de $p < 0.05$ como significativa. El riesgo se evaluó mediante el cálculo de Odds Ratio (OR) en un intervalo de confianza del 95% en el análisis bivariado y en la regresión logística binaria considerando la naturaleza de algunas variables.

RESULTADOS: El número de atenciones prenatales menor a 6 (OR=3.608; IC95%:1.634-7.970), antecedente de preeclampsia previa (OR=4.291; IC95%:1.130-16.299), anemia en la gestación (OR=3.974; IC95%:1.778-8.884), IMC pregestacional $\geq 25 \text{kg/m}^2$ (OR=4.035; IC95%:1.161-14.022), talla materna $< 1.55 \text{ cm}$ (OR=3.367; IC95%:1.526-7.433), residencia rural (OR=2.692; IC95%:1.268-5.712) y el estado civil casada (OR=0.184; IC95%:0.066-0.517) se asociaron significativamente con la preeclampsia.

CONCLUSIÓN: Los factores de riesgo asociados a la preeclampsia fueron el número de atenciones prenatales deficientes, el antecedente de preeclampsia en un embarazo anterior, anemia en la gestación, el sobrepeso antes del embarazo, la talla materna $< 1.55 \text{ cm}$ y la residencia rural. Sin embargo, se encontró que el estado civil casada es un factor protector.

PALABRAS CLAVES: Factor de riesgo, Preeclampsia, Gestante.