

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**FACTORES DE RIESGO DE MORTALIDAD NEONATAL EN LA UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DEL HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE 2021**

TESIS

PRESENTADA POR BACHILLER

DEYSI ANNIE ESCALANTE ARTEZANO

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE

MEDICO CIRUJANO

LIMA – PERÚ

2022

RESUMEN

Objetivo: Determinar los factores de riesgo de mortalidad neonatal en la unidad de cuidados intensivos neonatales de Hospital Nacional Hipólito Unanue en el año 2021.

Metodología: Estudio de enfoque cuantitativo, observacional, retrospectivo, analítico de casos y controles.

Resultados: los factores maternos: la edad gestacional menor de 20 años tiene 5,2 veces más riesgo de mortalidad neonatal, con un chi cuadrado de 18,5 y un $p < 0,05$; respecto a la edad gestacional tenemos 4,93 veces más riesgo de mortalidad neonatal y se encuentra asociado con un chi cuadrado de 18,5 y un $p < 0,05$. Los factores perinatales de riesgo para la mortalidad son la enfermedad de membrana hialina que tiene 4,7 veces más riesgo de mortalidad neonatal que las que no la presentaron, con un chi cuadrado de 9,1 y un $p < 0,05$. Los factores neonatales son el bajo peso al nacer que tiene 1,5 veces más riesgo de mortalidad neonatal que las que no presentaron, con un chi cuadrado de 1,1 y un $p < 0,05$; los que tienen sepsis neonatal tienen 5,5 veces más riesgo de mortalidad neonatal que las que no presentaron, con un chi cuadrado de 21,5 y un $p < 0,05$.

Palabras claves: mortalidad neonatal, factores maternos, perinatales y neonatales.