

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A TUBERCULOSIS
PULMONAR EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL
HOSPITAL DE APOYO DE PALPA DURANTE EL
PERIODO 2018-2021

TESIS
PRESENTADA POR BACHILLER
VILLAGARAY IPURRE LIDA
PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
MÉDICO CIRUJANO

ICA - PERÚ
2022

RESUMEN

Objetivo. Identificar los factores de riesgo asociados a tuberculosis pulmonar en pacientes atendidos en el Hospital de apoyo de Palpa durante el periodo 2018-2021.

Metodología. El estudio realizado es de tipo observacional, estudio analítico de casos y controles, transversal, de tipo retrospectivo. En una muestra de 53 pacientes con tuberculosis (Casos) y 106 pacientes sin tuberculosis (Controles),

Resultados: Los factores de riesgo para presentar tuberculosis pulmonar son: La edad de 50 años a menos $p=0,000$, $OR=4,5$ (IC95%:2,2-9,1), el sexo masculino $p=0,002$ $OR=2,9$ (IC95%:1,5-5,9), tener grado de instrucción primaria $p=0,001$, proceder de zona rural $p=0,012$ $OR=2,5$ (IC95%:1,2-5,2), tener ocupación obrero $p=0,001$, vivir en condiciones de hacinamiento $p=0,023$ $OR=2,8$ (IC95%:1,1-7,1). Consumir tabaco $p=0,018$ $OR=3,3$ (IC95%:1,2-9,2), consumir alcohol $OR=3,5$ (IC95%:1,4-8,8), consumir drogas $p=0,029$ $OR=4,3$ (IC95%:1,1-18,2). Tener como comorbilidad al VIH/SIDA $OR=4,3$ (IC95%:1,1-18,3), tener diabetes mellitus tipo 2 $p=0,018$ $OR=3,3$ (IC95%:1,2-19,2), y tener bajo peso o desnutrición $OR=5,9$ (IC95%:1,9-17,9).

Conclusiones: Los factores de riesgo asociados a tuberculosis pulmonar en pacientes atendidos en el Hospital de apoyo de Palpa durante el periodo 2018-2021 son la edad de 50 años a menos, sexo masculino, grado de instrucción primaria, procedencia rural, ocupación obrera, vivir en hacinamiento, consumir tabaco, alcohol o drogas y tener como comorbilidad al VIH/SIDA, diabetes tener bajo peso o desnutrición.

Palabras clave: Factores riesgo, Tuberculosis Pulmonar