

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**FACTORES ASOCIADOS A LA FALTA DE ADHERENCIA AL ESQUEMA I
ANTITUBERCULOSIS EN EL CENTRO DE SALUD LOS LIBERTADORES,
2020 -2021**

TESIS

PRESENTADA POR BACHILLER

NUÑOVERO ACUÑA VANESSA LUCIA

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
MÉDICO CIRUJANO**

LIMA – PERÚ

2023

RESUMEN

Objetivo: Determinar los factores asociados a la falta de adherencia al esquema I antituberculosis en el Centro de Salud Los Libertadores, 2020 – 2021.

Metodología: Estudio de enfoque cuantitativo, transversal, prospectivo, correlacional. En una la población muestral de 108 pacientes a quienes se les aplico el Test de morisky-green-levine, para analizar los factores asociados a la falta de adherencia al tratamiento.

Resultados: Los factores referidos al paciente, el tiempo que demora en llegar al establecimiento ($X^2=6.34$; $p=0.03$), la motivación del paciente en cumplir con el tratamiento ($X^2=6.10$; $p=0.01$), el estado de ánimo del paciente ($X^2=7.09$; $p=0.03$), el cambio en su estilo de vida debido a su enfermedad ($X^2=5.99$; $p=0.01$), no recibir apoyo de su familia ($X^2=17.79$; $p=0.01$), consumir alcohol ($X^2=13.12$; $p=0.01$), tabaco ($X^2=7.83$; $p=0.01$), drogas ($X^2=4.561$; $p=0.03$) y tener alguna comorbilidad ($X^2=9.65$; $p=0.02$), se asocian a la falta de adherencia. Los factores referidos a los fármacos, el exceso de medicamentos ($X^2=12.43$; $p=0.01$), desconocer los efectos indeseados de los fármacos ($X^2=4.08$; $p=0.04$), haber interrumpido el tratamiento por falta de estos ($X^2=11.59$; $p=0.01$) y presentar malestar cuando se toma los medicamentos ($X^2=5.48$; $p=0.01$) se asocian a la falta de adherencia. La no recepción por parte del médico a las dudas e inquietudes que tenga el paciente ($X^2=9.65$; $p=0.01$) se asocia a la falta de adherencia.

Conclusiones: Los factores socioeconómicos no se encuentran asociados a la falta de adherencia. Sin embargo, se obtuvo que los factores referidos al paciente, los fármacos y al establecimiento de salud están asociados a la falta de adherencia al esquema I antituberculosis en el Centro de Salud Los Libertadores, 2020 – 2021.