


**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**FACTORES QUE AFECTAN LA RECUPERACIÓN DE
LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS MENORES
DE 5 AÑOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL CARLOS
LANFRANCO LA HOZ EN ENERO – DICIEMBRE 2016.**

TESIS

PRESENTADA POR BACHILLER

JUAN JESÚS HUMBERTO ARANDA REYES

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
MÉDICO CIRUJANO**

LIMA-PERÚ

2017

RESUMEN

INTRODUCCIÓN: Dentro de las situaciones adversas que presenta un infante en recuperación de una desnutrición crónica, estos son factores que van a impedir su mejoría, evidenciándose en una estatura no acorde a su edad y enfermedades asociadas.

OBJETIVOS: Determinar los factores que afectan a la recuperación de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años atendidos en el Hospital Carlo Lanfranco la Hoz en Enero - Diciembre 2016.

METODOLOGÍA: Se realizó un estudio descriptivo, transversal, longitudinal, retrospectivo en niños menores de 5 años atendidos en el Hospital Carlos Lanfranco la Hoz Enero – Diciembre 2016. La recolección de datos se dio a partir de una encuesta entregada a las madres.

RESULTADO: Se trabajó con 80 niños menores de 5 años con diagnóstico de desnutrición crónica, con respecto a la edad materna el 37.5% tenían entre 14-18 años, la mayoría eran convivientes (62.5%), tenía 1 hijo (22.5%), y tenía 2 o más (77,5%), en el uso de sustancias su mayoría con un 75,0% es ninguno, el grado de instrucción de las madres es secundaria (51,3%), dieta y médico (28,8%), cumplen el tratamiento un 57,5%, sus ingresos económicos en la familia son en la mayoría con un 42,5% es <800 nuevos soles, un 70,0% son católicos, la enfermedad más relacionada con un 75,0% es la anemia, con respecto a la edad la mayoría con un 38,8% son de 4 años, se encontró que existen más casos de desnutrición crónica en niños de sexo masculino (47 casos), los niños de 4 años presentan mayor desnutrición crónica y median entre 96-102 centímetros.

CONCLUSIONES: Los factores son: la edad de la madre, el número de hijos, la integración familiar, el uso de sustancias por alguno de los padres, el grado de instrucción de la madre, si cumplen o no el tratamiento, la alimentación que continua después del tratamiento, los ingresos familiares, creencias religiosas y las enfermedades más frecuentes asociadas.

PALABRAS CLAVES: Factores, nutrición y pobreza.