

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA**  
**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**FACTORES ASOCIADOS AL PARTO PREMATURO EN  
PACIENTES DEL SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL  
HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES LIMA-  
PERÚ EN LOS AÑOS 2015-2016.**

**TESIS**

**PRESENTADA POR BACHILLER**

**LISBETH NATHALI ASTO MENESES**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE  
MÉDICO CIRUJANO**

**LIMA – PERÚ**

**2017**

## RESUMEN

**Presentación:** La primera causa de muerte de los neonatos en el Perú es el parto prematuro (60.6% de todos los prematuros nacidos).

**Objetivo:** Determinar los factores asociados al parto prematuro en pacientes del servicio de obstetricia del Hospital Nacional Sergio E. Bernales Lima-Perú en los años 2015-2016.

**Materiales y Métodos:** Es una investigación observacional, descriptivo y retrospectivo, se trabajó con la población de 68 pacientes que oscilaron entre las edades de 13 y 42 años que fueron tratadas en el servicio de obstetricia del Hospital Nacional Sergio E. Bernales en los años 2015 y 2016, la información se obtuvo por medio de la exploración de las historias clínicas, luego se empleó el programa estadístico SPSS 23 para la interpretación de los resultados.

**Resultados:** El factor que más se asoció al parto prematuro fue la infección del tracto urinario con un 27.94%, seguido de la ruptura prematura de membranas con un 23.53%, para luego seguir la infección de transmisión sexual, parto gemelar, preeclampsia severa, placenta previa, antecedente de parto prematuro entre otros en orden de frecuencia.

**Conclusiones:** Se concluye que presentar infección del tracto urinario es el factor que más se asocia al parto prematuro, así como las pacientes jóvenes y las que no tuvieron suficientes controles prenatales tuvieron parto prematuro moderado a tardío en su mayoría.

**Palabras claves:** parto prematuro, controles prenatales, edad gestacional.