

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A  
PREECLAMPSIA EN GESTANTES ADOLESCENTES  
DEL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DEL  
HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES EN EL  
AÑO 2016.**

**TESIS**

**PRESENTADA POR BACHILLER  
CAROLINA ELSA BRAVO VALENZUELA**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE  
MÉDICO CIRUJANO**

**LIMA – PERÚ**

**2017**

## RESUMEN

**Objetivos:** Determinar los Factores de Riesgo para Preeclampsia en Gestantes Adolescentes en el Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Nacional Sergio E. Bernales en el año 2016.

**Metodología:** Esta investigación es un estudio de tipo cuantitativo, observacional, analítico, retrospectivo, de casos y controles, por la forma en que se desarrollará, se tomará información de las historias clínicas.

**Resultados:** El consumo de alcohol con la preeclampsia se encontró una asociación estadísticamente significativa OR de 3,857 con Intervalo de Confianza de 1,382-10,764, entendiéndose que hay asociación significativa entre las variables. La primiparidad con la preeclampsia se encontró una asociación estadísticamente significativa y un OR de 2,810 con Intervalo de Confianza de 1,129-6,991, entendiéndose que hay asociación significativa entre las variables. El antecedente de aborto con la preeclampsia se encontró una asociación estadísticamente significativa y un OR de 4,111 con Intervalo de Confianza de 1,037-16,295, entendiéndose que hay asociación significativa entre las variables. Los controles prenatales mayores de 6 al analizar la relación con la preeclampsia se encontró relacionada significativamente, (OR=0,145; Intervalo de Confianza: 0.017-1,268). El antecedente familiar de HTA se encontró relación significativa y OR: 3,051 con Intervalo de Confianza de 1,032-9,022, entendiéndose que el antecedente familiar de HTA es un factor de riesgo estadísticamente significativo.

**Conclusiones:** Los Factores de Riesgo asociados a Preeclampsia en las gestantes adolescentes atendidas en el Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Nacional Sergio E. Bernales en el año 2016 fueron consumo de alcohol, primiparidad, antecedente de aborto, controles prenatales insuficientes y antecedente familiar de HTA.

**Palabras clave:** Preeclampsia, factor de riesgo