

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA**  
**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**CARACTERÍSTICAS PARA TRATAMIENTO NO  
QUIRÚRGICO DEL TRAUMATISMO HEPÁTICO EN EL  
HOSPITAL “DANIEL ALCIDES CARRIÓN”  
PERIODO 2012-2014**

**TESIS**

**PRESENTADA POR BACHILLER  
ELVIRA MERCEDES SÁNCHEZ CUYOTUPAC**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE  
MÉDICO CIRUJANO**

**LIMA - PERÚ**

**2017**

## RESUMEN

**Objetivos:** Determinar las características para tratamiento no quirúrgico del traumatismo hepático en el hospital “Daniel Alcides Carrión” periodo 2012-2014.

**Materiales y métodos:** Se realizó el estudio descriptivo, retrospectivo en el hospital “Daniel Alcides Carrión” periodo 2012-2014. Se obtuvo una muestra de 60 pacientes con diagnóstico de trauma hepático no quirúrgico, fueron incluidos y analizados donde se diseñó una ficha de recolección de datos para la recolección de datos, para el procesamiento se utilizó el programa estadístico SPSS v.23.

**Resultados:** La mayoría de los pacientes es de género masculino (70%); grupo etario; siendo más frecuente entre los 20-40 años 48,3% (29 pacientes) personas que tienen más actividad laboral y riesgo de sufrir más accidentes; la estabilidad hemodinámica se presentó en la mayoría de nuestros pacientes, el 98.3%; la ausencia de signos peritoneales se presentó en sólo 3.3%. (2 pacientes); la ausencia de lesión abdominal fue del 100%; 85% de nuestros pacientes no presentaron lesiones extra abdominales asociadas; la gran mayoría de nuestros pacientes no requieren sangre transfusiones 40% (24 pacientes); los pacientes que presentan menor grado de lesión hepática, tienen menos riesgo de la cirugía; en nuestro paciente el 95% (57 pacientes) presentan hemoperitoneo inferior a 500cc.

**Conclusiones:** La estabilidad hemodinámica, ausencia de signos peritoneales, la ausencia de lesiones abdominales asociadas, menos dos transfusiones de paquetes globulares, traumatismo hepático grado II y III, menos de 500cc de hemoperitoneo y disminución del hematocrito a menos de 8% han demostrado ser características para el tratamiento no quirúrgico.

**Palabras claves:** trauma hepático, manejo no quirúrgico.