

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**FACTORES DE RIESGO PARA INFECCIÓN DE TRACTO
URINARIO POR GÉRMENES PRODUCTORES DE
BETALACTAMASA DE ESPECTRO EXTENDIDO EN EL
HOSPITAL NACIONAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ,
PERIODO FEBRERO-ABRIL DEL 2016**

TESIS

PRESENTADA POR BACHILLER

KENYI TAKASHI MATSUMOTO CONDORI

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE

MÉDICO CIRUJANO

LIMA – PERÚ

2017

RESUMEN

Objetivo: Se determinó los principales factores de riesgo para adquirir infección del tracto urinario por gérmenes productores de betalactamasas de espectro extendido en el Hospital Nacional Lanfranco La Hoz, periodo Febrero – Abril del 2016

Material y Métodos: Se llevó a cabo un estudio de tipo analítico, observacional, retrospectivo, de casos y controles.

Resultados: El análisis estadístico sobre las variables en estudio como factores de riesgo fue: edad avanzada (OR: 5.76; $p < 0.05$), antecedente de hospitalización (OR: 4.2; $p < 0.05$), uso previo de antibióticos (OR: 3.9; $p < 0.05$), comorbilidad (OR: 2.7; $p < 0.05$).

Conclusiones: La edad avanzada, antecedente de hospitalización, uso previo de antibióticos y comorbilidad son factores de riesgo para adquirir infección del tracto urinario por gérmenes productores de betalactamasas de espectro extendido en el Hospital Nacional Lanfranco La Hoz, periodo Febrero – Abril del 2016

Palabras Clave: Infección del tracto urinario, betalactamasas de espectro extendido.