


UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**FACTORES DETERMINANTES PARA RUPTURA
PREMATURA DE MEMBRANAS EN GESTANTES
PRIMIGESTAS DEL DEPARTAMENTO DE GINECO-
OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO
UNANUE, DURANTE EL PERÍODO ENERO-DICIEMBRE
DEL AÑO 2016, LIMA-PERÚ.**
TESIS

**PRESENTADO POR BACHILLER
MIRELLA VANESSA ANGELES RODRÍGUEZ**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL
MÉDICO CIRUJANO**

**LIMA-PERÚ
2017**

RESUMEN

Introducción: La ruptura prematura de membranas (RPM) se define como la pérdida de continuidad de las membranas ovulares antes del inicio del trabajo de parto. La prevalencia de RPM de manera general ha aumentado en el Hospital Nacional Hipólito Unanue (HNHU) según reporte estadístico de años anteriores en el 2015 se reportó 443 gestantes con RPM de las cuales 38.9% fueron gestantes primigestas y en el año 2014 se reportó 436 gestantes con RPM de las cuales 34.5% fueron gestantes primigestas ⁽⁵⁾. Existen diversos factores determinantes maternos asociados a esta patología. **Materiales y métodos:** Se realizó un tipo observacional, no experimental, descriptivo, retrospectivo y transversal en gestantes primigestas con diagnóstico de RPM del departamento de Gineco-obstetricia del Hospital Nacional Hipólito durante el período Enero-Diciembre del año 2016, con una población de 221 pacientes y una muestra de 141 pacientes de quienes se revisaron sus historias clínicas para identificar qué factores de predisponentes presentaron para la RPM. El análisis estadístico se hizo mediante el programa SPSS versión 23. **Resultados:** Los factores determinantes encontrados son: nivel socioeconómico bajo 81%, seguido por infección cervico-vaginal 48.2% e infección urinaria 34.8%. Otros resultados fueron: embarazo gemelar 5%, antecedente de metrorragia 8.5%, > 6 controles prenatales 50.4%, IMC normal 49.6%, antecedente de tabaquismo 9.9%, edad materna media 24.61 años y el grado de instrucción secundaria tiene mayor frecuencia 75,9%. **Conclusión:** Según el estudio realizado los factores de sociodemográficos asociados a ruptura prematura de membranas en gestantes primigestas más frecuente fueron el bajo nivel socioeconómico con 81.6% (115 pacientes). Los factores gineco-obstétricos presentados por la población de estudio, los que más se relacionan con ruptura prematura de membranas son: infección cervico-vaginal con 48.2% (68 pacientes) e infección urinaria con 34.8% (49 pacientes).

Palabras claves: Ruptura prematura de membranas, factores determinantes, gestante primigesta.