

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA**  
**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**CONSIDERACIONES CLÍNICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LA  
ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA EN NIÑOS DE 1 A 5  
AÑOS DE EDAD HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE  
PEDIATRÍA DEL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ  
ENERO-DICIEMBRE 2016.**

**TESIS**

**PRESENTADA POR BACHILLER  
HUAMÁN MORÁN CÉSAR JULINHO**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE  
MÉDICO CIRUJANO**

**LIMA – PERÚ**

**2017**

## RESUMEN

**Objetivo:** Conocer las consideraciones clínicas epidemiológicas de la enfermedad diarreica aguda en niños de 1 a 5 años de edad hospitalizados en el servicio de pediatría del hospital “Carlos Lanfranco La Hoz” (HCLLH). Enero-Diciembre 2016  
**Materiales y Métodos:** cuantitativo, descriptivo, con 53 niños de 1 a 5 años de edad hospitalizados en el servicio de pediatría del hospital “Carlos Lanfranco la hoz”. Enero-Diciembre 2016. Técnica, documentación de historias clínicas y como instrumento, ficha de recolección de datos de la historia clínica.

**Resultados:** La edad predominante fue la de 1 año 45,3%. En el género masculino la enfermedad diarreica aguda fue más frecuente 52.8 %. La mayoría de los niños son procedentes del distrito de Zapallal 52.8 %. En el 77.4 % de los hogares de los niños crían animales. El 56,6 % no cuenta con saneamiento básico, El predominio de la enfermedad diarreica aguda fue entre diciembre a mayo 69,8 %. El tiempo de enfermedad predominante fue de 4 a 7 días 67,9 %. El 71,7% de los niños tuvo vómitos y el 62,3% fiebre en el transcurso de su enfermedad. La frecuencia de las deposiciones en 24 horas fue  $\geq 5$  cámaras en 24 horas 52 %. Los episodios de vómitos en 24 horas fueron  $\geq 4$  veces 41.5 %.

**Conclusiones:** La edad más frecuente en la que se encontró la enfermedad diarreica aguda fue la de 1 año y el género más frecuente fue el masculino. La procedencia más frecuente fue Zapallal, los meses del año en el que predominó la enfermedad diarreica aguda fueron entre los meses de diciembre a mayo. La mayoría de los hogares de los niños con enfermedad diarreica aguda no cuentan con saneamiento básico y crían animales. La mayor cantidad de niños entro al servicio de pediatría con un tiempo de enfermedad de 4 a 7 días. La mayoría tuvo episodios de vómitos y fiebre en el transcurso de su enfermedad, la mayor parte de los niños tuvo  $\geq 5$  cámaras de diarrea en 24 horas y episodios de vómitos  $\geq 4$  veces en 24 horas.

**Palabras claves:** diarrea, vómitos, fiebre, saneamiento básico.