

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**FACTORES QUE DESCOMPENSAN LA DIABETES
MELLITUS TIPO 2 EN PACIENTES DE 40-60 AÑOS
HOSPITAL REZOLA - CAÑETE
ENERO –JUNIO 2016.**

TESIS

PRESENTADA POR BACHILLER

PAMELA ESTHEFANNY ISIDRO DURAN

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE

MÉDICO CIRUJANO

LIMA – PERÚ

2017

RESUMEN

El presente trabajo tiene como finalidad determinar cuáles son los factores que descompensan a los pacientes diabéticos tipo 2, abarcando la frecuencia, el factor sociocultural, patologías asociadas que pueden producir en el paciente el ausentismo laboral, discapacidad y mortalidad producto de complicaciones agudas y crónicas.

Se realizó un estudio de enfoque cualitativo, diseño observacional de tipo transversal, descriptivo y retrospectivo en pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 descompensada de enero a junio con edades entre los 40-60 años, habiendo un total de 60 pacientes que fueron atendidas en el hospital Rezola-Cañete, la recolección de datos fue mediante revisión de las historias clínicas.

Se concluye que los pacientes diabéticos se descompensan por infecciones del tracto urinario en un 60 % ; siendo el género femenino el más frecuente en descompensarse en un 83, 4%, presentándose en la población adulta entre los 50-60 años de edad, respecto al tiempo de evolución resulta que entre los 5 a 10 años es donde se produce mayor complicaciones. Las personas con nivel de instrucción secundario no cumplen con las indicaciones, teniendo una mala adherencia al tratamiento y llevando un mal control metabólico.

Palabras claves: Diabetes Mellitus tipo 2 descompensada, factor sociocultural.