

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA**  
**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA PREECLAMPSIA**  
**EN LAS GESTANTES DEL SERVICIO DE OBSTETRICIA**  
**DEL HOSPITAL VITARTE DURANTE EL AÑO 2016**

**TESIS**

**PRESENTADO POR BACHILLER**

**PAMELA ALESSANDRA LEON AGUIRRE**

**PARA OPTAR POR EL TÍTULO PROFESIONAL DE**

**MÉDICO CIRUJANO**

**LIMA-PERÚ**

**2017**

## RESUMEN

**Objetivo:** Determinar las características clínicas de la preeclampsia en las gestantes del servicio de Obstetricia del Hospital Vitarte durante el año 2016.

**Pacientes y Métodos:** Esta investigación es un estudio Descriptivo, Observacional y Retrospectivo con una población de 149 gestantes con el diagnóstico de preeclampsia del Servicio de Obstetricia del Hospital de Vitarte y estuvo conformada por 55 pacientes al azar. El instrumento empleado fue la ficha de recolección de datos a través de las historias clínicas. Con los datos obtenidos en las encuestas realizadas, se procedió a analizarlos con el uso de SPSS versión 22.0.

**Resultados:** Esta investigación reporta con respecto a la edad, el 60% correspondieron a las edades comprendidas entre 19 y 34 años, con respecto a la paridad, el 54.5% de las gestantes fueron primíparas; con respecto a los antecedentes familiares de preeclampsia sólo 5.5% tuvieron antecedentes, el cual no excluye; además el 78,2% tuvieron más de 6 controles prenatales, con respecto al tipo de preeclampsia, el 74,5% obtuvieron preeclampsia leve, se evidenció que el 58,2% presentaron proteinuria, con relación a la vía de terminación, las cesáreas representaron el 76.4% de las gestantes con preeclampsia; Asimismo, se observó que existe relación significativa entre la vía de terminación y el tipo de preeclampsia  $p < 0.016$ .

**Conclusiones:** La prevalencia de la preeclampsia fue del 4.41%. Siendo la cefalea el síntoma más frecuente con un 41,8%, el tipo de preeclampsia más frecuente fue la preeclampsia leve. También se observó que la cesárea fue la vía de terminación con mayor frecuencia con un 76.4%.

**Palabras clave:** preeclampsia, gestantes