

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS
PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE
TUBERCULOSIS EN EL CENTRO DE SALUD DE
VILLA MARÍA DEL PERPETUO SOCORRO DEL
AÑO 2010 AL 2016 LIMA- PERÚ**

TESIS

**PRESENTADO POR EL BACHILLER
ANTHONY ERNESTO LOVERA PELÁEZ**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
MÉDICO CIRUJANO**

**LIMA – PERÚ
2017**

RESUMEN

Objetivo: determinar las características epidemiológicas de los pacientes con diagnóstico de tuberculosis atendidos en el Centro de Salud de Villa María Perpetuo Socorro durante el periodo del 2010 al 2016 Lima-Perú.

Metodología: El diseño de esta investigación es observacional, de tipo descriptivo y de corte retrospectivo. La población está constituida por 311 pacientes con diagnóstico de TB. Se empleó una ficha de recolección de datos. Para el procesamiento y análisis de los datos se utilizó el SPSS versión 23 para el análisis. Se utilizó estadística descriptiva para elaborar las tablas y gráficos mediante medidas central, frecuencias absolutas y relativas.

Resultados: Se observó mayor porcentaje son de sexo masculino con un 64.6%, y el grupo etario más frecuente está representada por los pacientes de 30 a 60 años, con un 46.6%, el hábito nocivo, el de mayor porcentaje fue las drogas con un 10%. Sólo el 21.2% de la población en estudio presenta alguna comorbilidad, dentro las cuales el mayor porcentaje es de VIH, con un 8.7%, dentro de la condición de ingreso la mayoría son casos nuevos con un 82.6%, El método diagnóstico más frecuente es el Bk, con un 77.8%, la forma más frecuente es la TB pulmonar Bk (+), con 32.5%, con respecto a las condiciones de egreso el mayor porcentaje es curado, con un 67.5%, pero se observa un 13.2% que abandonan el tratamiento. **Conclusiones:** en el presente estudio se observa disminución del 23 % de casos de tuberculosis durante los 6 años de estudio. El adulto de sexo masculino es más proclive a enfermar, predominando la forma pulmonar con baciloscopía positiva, siendo la TB pleural 53.8 % la más frecuente de todas la extrapulmonares afectando en gran medida a la población joven; 67 % de los pacientes fueron curados.

Palabras clave: Tuberculosis, características de tuberculosis, epidemiología