

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**FRECUENCIA DE COMPLICACIONES TEMPRANAS Y
TARDÍAS POSTERIORES AL USO DE LAS TÉCNICAS DE
LICHTENSTEIN Y NYHUS EN EL MANEJO DE HERNIAS
INGUINALES EN EL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO
UNANUE EN EL PERIODO DE 2016.**

TESIS

**PRESENTADA POR BACHILLER
MARCIO ANDRE MENESES MUÑOZ**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
MÉDICO CIRUJANO**

LIMA – PERÚ

-2017-

RESUMEN

Objetivo: Conocer la frecuencia de complicaciones tempranas y tardías secundarias al uso de las técnicas de Lichtenstein y Nyhus en el manejo de hernias inguinales en el Hospital Nacional Hipólito Unanue en el periodo de 2016.

Materiales y métodos: El estudio es de tipo observacional, descriptivo, transversal, retrospectivo. La técnica de recolección de datos fue de análisis documental. El instrumento utilizado fue la ficha de recolección de datos de complicaciones tempranas y tardías en el manejo de la hernia inguinal con las técnicas Lichtenstein y Nyhus. Se trabajó con toda la población, 74 pacientes con hernia inguinal manejados con las técnicas mencionadas.

Resultados: El intervalo de edad de la mayoría de los pacientes con hernia inguinal tratados con las técnicas Lichtenstein y Nyhus, se encuentran entre los 42 y 65 años (43.2%). Un 29.7% de los pacientes fueron del sexo femenino y 70.3% de sexo masculino.

Un 43.2% presentó un IMC de 25 a 29.9 kg/m² clasificados como sobrepeso. Sobre las técnicas quirúrgicas, un 86.5% de los casos estudios fueron tratados con Lichtenstein y un 13.5% con Nyhus.

Conclusiones: Del total de la población investigada, la mayoría fue tratada con la técnica de Lichtenstein (86.5%) y en menor porcentaje con Nyhus (13.5%). De todos los pacientes tratados quirúrgicamente, la técnica de Nyhus presentó una mayor frecuencia de complicaciones tempranas respecto a la de Lichtenstein, un 30.0% frente a 14.1% respectivamente, y en cuanto a las complicaciones tardías, la técnica de Nyhus presentó mayor porcentaje de complicaciones (20%) que aquellos tratados con Lichtenstein (4.7%).

Palabras clave: hernia inguinal, Lichtenstein, Nyhus, complicaciones tempranas y tardías.