

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

**ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA SÍFILIS  
CONGÉNITA EN NEONATOS HOSPITALIZADOS EN  
EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL  
NACIONAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ EN EL  
PERIODO DE ENERO 2013 - DICIEMBRE 2016.**

**TESIS**

**PRESENTADA POR BACHILLER**

**PEDRO ORDOÑEZ LARREA**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE  
MÉDICO CIRUJANO**

**LIMA - PERÚ**

**2017**

## RESUMEN

**Objetivo:** Determinar los factores que contribuyen a la sífilis congénita en neonatos hospitalizados en el servicio de neonatología del Hospital Nacional Carlos Lanfranco La Hoz en el periodo de enero 2013 - diciembre 2016.

**Diseño metodológico:** Estudio transversal ,retrospectivo y descriptivo. Se utilizó la ficha de recolección de datos, basándose en la observación de las historias clínicas.

**Análisis estadístico:** La información obtenida se incorporó en una base de datos del paquete estadístico SPSS Versión 22, previa codificación.

**Material y métodos:** Se tomara como muestra a toda la población que son 40 neonatos con sífilis congénita que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, se utilizó la ficha de recolección de datos, basándose en la observación de las historias clínicas. Las variables estudiadas: sífilis congénita y los factores que contribuyen a la sífilis congénita

**Resultados:** En la madre el 62.5% son convivientes, 82.5% tienen estudios secundarios, 80% son ama de casa. 92.5% tienen menos de seis controles prenatales, el 75% tienen solo una pareja sexual, el 12.5% fueron diagnosticadas a las 29 semanas de gestación, el 70% fueron diagnosticadas de sífilis en la etapa de puerperio, 10 % recibieron tratamiento completo durante el embarazo. Acerca del neonato, el 60% son a término, 57.5% son del sexo femenino, 42.5% son masculinos. El 67.5% de los neonatos nacieron con un peso mayor a 2500gr que es considerado adecuado y el 82.5% nacieron con un apgar > a 7 que es considerado normal.El 7.5% presentó hepatoesplenomegalia.

**Conclusión:** Hay una relación significativa de aquellos factores que contribuyeron a la adquisición de sífilis congénita en neonatos

**Palabras clave:** Sífilis congénita, gestación, neonato