

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



FACTORES ASOCIADOS A SEPSIS NEONATAL
HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE
ENERO-JUNIO 2016

TESIS

PRESENTADA POR BACHILLER
JORGE EDUARDO YACHAS ESPINOZA
PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
MÉDICO CIRUJANO

LIMA – PERÚ

2017

RESUMEN

Objetivo: Determinar cuáles son los factores asociados a sepsis neonatal en el Servicio de Neonatología del hospital Nacional Hipólito Unanue en el periodo de enero-junio del 2016.

Material y Métodos: Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo. La muestra en el estudio fue de 144 neonatos con diagnóstico de sepsis neonatal atendidos en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, donde se realizó la revisión de registros clínicos y recolección mediante un instrumento validado por expertos, datos que fueron procesados por 2 programas estadísticos y así poder obtener resultados.

Resultados: De las 144 muestras se obtuvo 29 prematuros (20.1%), a 104 madres de neonatos con sepsis neonatal (72.2%) le realizaron ≥ 4 tactos vaginales, 5 madres de la muestra (3.5%) tuvieron vulvovaginitis, 22 madres de la muestra (15.3%) tuvieron infección del tracto urinario, a 106 madres de la muestra (73.6%) le realizaron parto vía vaginal, 125 madres de la muestra (86.8%) tuvieron ruptura prematura de membranas, 30 madres de la muestra (20.8%) tuvieron corioamnionitis clínica.

Conclusiones: Se determinó que los factores asociados para sepsis neonatal en el Hospital Nacional Hipólito Unanue son: la prematuridad, el número de tactos vaginales (la realización ≥ 4 tactos vaginales en madres de la muestra), el tipo de parto (específicamente parto vía vaginal) realizado a las madres de la muestra, la infección del tracto urinario en las madres de la muestra, la ruptura prematura de membranas en las madres de la muestra, la corioamnionitis clínica que presentaron las madres de la muestra.

Palabras claves: Factores asociados, sepsis neonatal.