

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LA
APENDICITIS AGUDA EN LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA DEL
HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE EN EL PERIODO
2016.**

TESIS

**PRESENTADA POR BACHILLER
JORGE GUSTAVO PALACIOS RODRÍGUEZ**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
MÉDICO CIRUJANO**

LIMA – PERÚ

2017

RESUMEN

Objetivo: Determinar las características clínicas y epidemiológicas de la apendicitis aguda en la población pediátrica atendida en el Hospital Nacional Hipólito Unanue en el periodo de 2016.

Materiales y métodos: La técnica de recolección de datos fue de análisis documental. El instrumento utilizado fue la ficha de recolección de datos de la historia clínica sobre características clínicas y epidemiológicas de la apendicitis aguda. Se trabajó con toda la población, 91 pacientes pediátricos con apendicitis aguda.

Resultados: El intervalo de edad más frecuente fue de 10 a 14 años (59.3%). Así mismo, obtuvimos que un 26.4% eran del sexo femenino y 73.6% de sexo masculino. Se obtuvo que un 40.7% presentaba un tiempo de enfermedad entre las 24 a 48 horas y que un 61.5% presento el cuadro de apendicitis aguda de manera brusca. La localización inicial del dolor más frecuente fue en el epigastrio (47.3%), y la localización final fue en la zona de la fosa iliaca derecha, en un 74.7% de los pacientes. En cuanto a los síntomas, el más frecuente fueron los vómitos (78%), mientras que el punto doloroso más frecuente fue el de Mc Burney (91.2%). El 37.36% de los casos presento un recuento leucocitario entre los 10 000 y 15 000 leucocitos/mm³. El nivel de hemoglobina en su mayoría estuvo entre los 11 a 12 g/dl (47.3%). En el 53.85% de los casos, el examen de orina se encontró normal y dentro de los hallazgos ecográficos, el 40.66% resultó ser patológico. El tipo de apendicitis aguda más frecuente al momento del diagnóstico fue el de apendicitis aguda complicada, con un 51.65%.

Conclusiones: Dentro del estudio, se encontró que la mayoría de casos de apendicitis aguda en la población pediátrica están comprendidos entre los 10 y 14 años, el sexo masculino es predominante frente a esta patología. Los síntomas y signos con mayor porcentaje fueron los vómitos, alza térmica y

náuseas, en ese orden. La localización inicial del dolor mayormente fue en la zona del epigastrio (47.3%), y la localización final del dolor abdominal, en la fosa iliaca derecha (74.7%). Se obtuvo que el tipo de apendicitis aguda más frecuente al momento del diagnóstico fue la apendicitis aguda complicada, en un 51.6%.

Palabras clave: apendicitis aguda, pediatría, características clínicas, características epidemiológicas