

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

**ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A  
BRONQUIOLITIS EN NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS  
HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRIA  
EN EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ  
DURANTE EL PERIODO DE MAYO A OCTUBRE DEL  
2016.**

**TESIS**

**PRESENTADA POR BACHILLER**

**JULISSA MICAELA QUISPE LÓPEZ**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE**

**MÉDICO CIRUJANO**

**LIMA – PERÚ**

**2017**

## RESUMEN

La bronquiolitis es una infección de vías respiratorias bajas; genera un número importante de hospitalizaciones en menores de dos años.

**OBJETIVO:** Determinar los factores de riesgo asociados a la bronquiolitis en niños menores de 2 años hospitalizados en el servicio de pediatría en el hospital Carlos Lanfranco La Hoz durante el periodo de mayo a octubre del 2016.

**METODO:** se realizó un estudio descriptivo, prospectivo y transversal, identificando factores de riesgo presentes en niños hospitalizados con bronquiolitis.

**RESULTADOS:** la mayoría de pacientes hospitalizados fueron del sexo masculino 69% y femenino 31%. Dentro de los factores durante el embarazo se encontró que el 77% de las madres estuvo expuesta al humo de cigarrillo, en los factores según antecedentes familiares y personales se encontró que el 60% de niños no cuenta con sus vacunas completas para la edad, el 64 % tienen antecedentes de asma, dermatitis o alergia; en factores nutricionales se encontró que el 69% no recibe lactancia materna exclusiva, en los factores ambientales encontramos que el 59% de niños tienen familiares que fuman en casa, y un 73% de niños viven en hacinamiento ya que conviven con 5 a más personas.

**CONCLUSIONES:** lactancia mixta es un factor de riesgo para desarrollar bronquiolitis; la inmunización de acuerdo a la edad es importante para no contraer bronquiolitis u otra infección respiratoria, esto se debería a que las defensas en estos niños suele ser más baja y por ende a ser más susceptibles; el hacinamiento es otro factor muy importante ya que el niño se encuentra más propenso a desarrollar bronquiolitis.

Palabras claves: BRONQUIOLITIS, FACTORES DE RIESGO