

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS OBSTETRICAS EN
PUÉRPERAS CON OBESIDAD HOSPITALIZADAS EN EL
SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL
ARZOBISPO LOAYZA DURANTE EL PERIODO 2015,
LIMA-PERU.**

TESIS

PRESENTADO POR BACHILLER:

ANALUCIA DEL ROSARIO DÁVILA LLERENA

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE:

MEDICO CIRUJANO

LIMA – PERÚ

2016

RESUMEN

Objetivo: Determinar la frecuencia de complicaciones quirúrgicas obstétricas en puérperas con obesidad hospitalizadas en el servicio de obstetricia del Hospital Nacional Arzobispo Loayza durante el periodo 2015, Lima-Perú.

Material y método: Para la presente tesis se realizó un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo; en el servicio de obstetricia del Hospital Nacional Arzobispo Loayza durante el periodo 2015. La población está constituida por 364 puérperas obesas post cesareadas. Debido a que este estudio constituyó toda la población total se consideró ingresar al estudio a las 364 pacientes. Por lo que este trabajo de investigación no cuenta con un cálculo formal del tamaño de muestra. La información fue recolectada principalmente de las historias clínicas perinatales CLAP (Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano de la OPS/OMS)

Conclusiones: Se obtuvo que del total de 364 puérperas obesas post cesareadas, el 134 (36.8%) presentaron complicaciones quirúrgicas obstétricas de diferente índole. Por otro lado se halló que 230 (63.2%) puérperas obesas post cesareadas no realizaron ninguna complicación. Las tres complicaciones quirúrgicas obstétricas más frecuentes en puérperas con obesidad fueron, la infección de sitio operatorio con un 55.2% (74), en segundo lugar las infecciones del tracto urinario con 35.1% (47), en tercer lugar la endometritis con 5.2% (7). Se halló que el 50.4% (71) de puérperas con obesidad que desarrollaron complicaciones quirúrgicas obstétricas, no llevaron un adecuado control prenatal (<6 CPN) en comparación con el 28.3% (63) de puérperas con obesidad que desarrollaron complicaciones quirúrgicas obstétricas que si llevaron un adecuado control prenatal (>6 CPN). Se determinó que las complicaciones obstétricas quirúrgicas en puérperas obesas fue 134 (36,8%) en comparación con las puérperas con peso normal 108 (11.8%).

Palabras claves: Complicaciones quirúrgicas obstétricas, obesidad y controles prenatales.