

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA**  
**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**“ASOCIACIÓN ENTRE EL PARTO QUIRÚRGICO Y LA  
DEPRESIÓN POSTPARTO VALORADO CON LA  
ESCALA DE EDIMBURGO EN PUÉRPERAS  
ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE  
OBSTETRICIA A DEL INSTITUTO NACIONAL  
MATERNO PERINATAL DURANTE EL MES DE  
DICIEMBRE DEL 2015 LIMA-PERÚ”**

**TESIS**

**PRESENTADA POR BACHILLER  
ELENA FIORELLA, TACURI CIÑA**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE  
MEDICO CIRUJANO**

**LIMA - PERU  
2016**

## RESUMEN

**Objetivo:** Establecer la asociación entre el parto quirúrgico y la depresión postparto valorado con la escala de Edimburgo en puérperas adolescentes atendidas en el servicio de Obstetricia A del Instituto Nacional Materno Perinatal durante el mes de Diciembre del 2015 Lima-Perú.

**Materiales y métodos:** El presente estudio es de tipo retrospectivo, analítico y observacional, en el cual se utilizó una ficha de datos y la aplicación de la escala de Edimburgo en puérperas adolescentes atendidas en el servicio de Obstetricia A del Instituto Materno Perinatal durante el mes de Diciembre.

**Resultados:** Se aplicó la escala de Edimburgo a 54 puérperas adolescentes entre los 14 y 19 años de edad, el 42% de puérperas tenían 19 años. Un 55% de puérperas con parto quirúrgico dio puntaje positivo para depresión postparto, mientras 41,2% con parto no quirúrgico.

**Conclusiones:** La depresión postparto es una enfermedad frecuente, ya que se halló que cerca al 50% de puérperas adolescentes dio puntaje positivo en la escala de Edimburgo, más el tipo de parto no influyo en la presencia de depresión postparto.

**Palabras clave:** *depresión postparto, parto quirúrgico*