

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA**  
**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A RUPTURA  
PREMATURA DE MEMBRANAS EN GESTANTES DEL  
III TRIMESTRE DEL SERVICIO DE PATOLOGIA  
OBSTETRICA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO  
UNANUE EN EL PERIODO DE ENERO – DICIEMBRE  
2014**

**TESIS**

**PRESENTADO POR BACHILLER:  
MILAGROS JESUS, LEVANO GONZALES**

**PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE  
MEDICO CIRUJANO**

**LIMA – PERÚ  
2016**

## RESUMEN

**Introducción:** La rotura prematura de membranas se define como la rotura espontánea de membranas ovulares después de las 22 semanas de edad gestacional y hasta una hora antes del inicio del trabajo de parto.

**Objetivos:** Determinar cuáles son los factores de riesgo asociados a RPM en gestantes del III trimestre en el servicio de patología obstétrica del Hospital Nacional Hipólito Unánue durante el periodo Enero a Diciembre 2014. **Material y método:** Es un estudio observacional tipo descriptivo, corte transversal, y retrospectivo. La población estuvo conformada por las gestantes del III Trimestre atendidas en el servicio de patología obstétrica del HNHU durante el periodo de Enero – Diciembre 2014. La información se obtuvo de las historias clínicas, y se utilizó una ficha de recolección de datos, se obtuvo un total de 792 pacientes que tuvieron RPM, y a través de la fórmula se obtuvo una muestra de 264 pacientes. **Resultados y conclusiones:** La incidencia de RPM es el 6,7% del total. Los factores de riesgo socio demográficos asociados a RPM: Edad entre 18 – 34 años fue la más frecuente, Estado civil conviviente 47% (124), grado de instrucción primaria 49.6% (131), y como factores de riesgo obstétricos: Nuliparidad 43,2% (114) y periodo intergenesico < 2 años 77.3% (204). Tomando en cuenta la relación entre infecciones y RPM, se evidencia que en mayor frecuencia tuvieron infección del tracto urinario 53% (158), seguido de infección vaginal 47% (124). El control prenatal juega un papel importante ya que el 64% (169) de las gestantes solo tuvieron de 1 – 3 controles. Como complicaciones del RPM, se observó que el 63% (166) de neonatos presentaron sepsis neonatal.

**PALABRAS CLAVES:** Ruptura prematura de membranas, factores de riesgo.