

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
ESCUELA DE POSGRADO**



**FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL PRECÁNCER DE
CÉRVIX EN PACIENTES DEL HOSPITAL FÉLIX
TORREALVA GUTIERREZ. ICA. 2019.**

**TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN:
SALUD PÚBLICA**

**PRESENTADO POR LOS BACHILLERES:
YBASETA SOTO, MARJORIE FABIOLA VICTORIA
LOVERA TATAJE, IRIS AVELINA**

LIMA, PERÚ

2022

RESUMEN

Objetivo: Determinar los factores asociados a la presencia del precáncer de cérvix en las pacientes atendidas en el Hospital Félix Torrealva Gutiérrez. Ica. 2019.

Tipo y Diseño: El enfoque es de tipo cuantitativo, el tipo de estudio es analítico de diseño caso – control. La población estuvo conformada por un total 11452 pacientes mujeres que se le realizaron un tamizaje de Papanicolau. Se seleccionó una muestra de 390 mujeres: 130 casos (diagnosticadas con precáncer de cérvix confirmados histológicamente) y 260 controles (sin la presencia de precáncer de cérvix). La información se recolectó de las historias clínicas mediante la aplicación de una ficha de recolección de datos.

Resultados: Se determinaron los factores de riesgo asociados a la presencia de precáncer de cérvix, posterior a realizar el análisis multivariado: Tener de 15 a 24 años (OR: 17.0; IC95%: 3.6 - 80.3), tener de 2 o más parejas sexuales en su vida (OR: 97.3; IC95%: 37.7- 251.3), no utilizar método del ritmo (OR: 9.0; IC95%: 2.7 - 30.4) y tener una ITS (OR: 15.7; IC95%: 1.7 - 331.3).

Conclusión: Se determinó la existencia de factores de riesgo que están asociados significativamente a la presencia de precáncer en las mujeres estudiadas.

Palabras clave: factores de riesgo, lesión intraepitelial cervical de alto grado, enfermedad cervical