UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL ABANDONO DE TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS EN PACIENTES DEL CENTRO MATERNO INFANTIL JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

TESIS

PRESENTADA POR BACHILLER

PALPA LUQUE ANA ELENA

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE

MÉDICO CIRUJANO

LIMA – PERÚ

2024

RESUMEN

Objetivo: Determinar los factores de riesgo asociados al abandono de

tratamiento de tuberculosis en pacientes del centro materno infantil José

Carlos Mariátegui - 2019 – 2023.

Materiales y métodos: Investigación de tipo aplicado, analítica, retrospectivo

de nivel explicativo. La población fue de 145 pacientes del programa de

tuberculosis que recibieron tratamiento del 2019 al primer trimestre del 2023,

la muestra fue de 23 casos y 5 controles por cada caso (n=135). La asociación

se evaluó con la prueba de chi cuadrado y la regresión logística simple.

Resultados: La mayoría de los pacientes con tratamiento de tuberculosis (TB)

tenían de 18 a 35 años (62,3%), del sexo masculino (65,2%), solteros (52,2%),

con nivel de instrucción secundaria (60,1%), el 13% y 18,8% consumían

drogas y alcohol respectivamente. Fueron factores de riesgo de abandono de

tratamiento de TB, en los factores sociodemográficos, la drogadicción

(OR=4,136), el alcoholismo (OR=4,760), en los factores clínicos los síntomas

como la diaforesis (OR=2,741), disnea (OR=4,364), debilidad (OR=5,182), en

los factores del tratamiento, recibir menos de tres visitas domiciliarias por el

personal de salud (OR=0,094), Score inicial de riesgo de abandono de nivel

medio (OR=7,784), presentar efectos secundarios del tratamiento de TB

(OR=4,434) y la intolerancia digestiva (OR=3,825).

Conclusión: La drogadicción, alcoholismo, la presencia de síntomas como

diaforesis, disnea, debilidad, el score de riesgo de abandono, los efectos

secundarios, la intolerancia digestiva son factores asociados al abandono del

tratamiento de TB y las visitas domiciliarias disminuyen el riesgo de abandono.

Palabras clave: Abandono de tratamiento, tuberculosis, efectos secundarios

۷I

INFORME ANTIPLAGIO

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL ABANDONO DE TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS EN PACIENTES DEL CENTRO MATERNO INFANTIL JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

INFORME DE ORIGINALIDAD							
25 INDICE I		3% ENTES DE INTERNET	5% PUBLICACIONES	11% TRABAJOS DEL ESTUDIANTE			
FUENTES F	RIMARIAS						
1	repositorio. (Fuente de Internet	upsjb.edu.pe			5%		
2	hdl.handle.r Fuente de Internet	net			3%		
3	Submitted to Bautista Trabajo del estudian		d Privada Sar	n Juan	3%		
4	repositorio. (Fuente de Internet	urp.edu.pe			1%		
5	repositorio. (Fuente de Internet	unp.edu.pe			1%		
6	repositorio. (Fuente de Internet	ucv.edu.pe			1%		
7	repositorio. (Fuente de Internet	uap.edu.pe			1%		
8	theunion.or	g			1%		



UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA "Dr. Wilfredo E. Gardini Tuesta"

	INFORME D	E PORCENTAJE	DE COINCIDENCIAS	
FECHA: 05/02	2/24			
NOMBRE DEL	ESTUDIANTE			
ANA ELENA P	ALPA LUQUE			
TIPO DE PRO	DUCTO CIENTÍFIC	0:		
PROYTRAB	SIÓN BIBLIOGRÁF ECTO DE INVESTI AJO DE INVESTIG ECTO DE TESIS CULO	GACIÓN	() () () () (x) ()	
La tesis "Facti	ores de riesgo aso no infantil José C	ociados al abandono de	A SOFTWARE ANTIPLAGIO TURNITIN): e tratamiento de tuberculosis en paci dentro del rango de similitud acepta	entes del
Conformidad	Investigador:		Conformidad Asesor:	
f.	7			
Nombre: ANA	A ELENA PALPA LI	JQUE	Nombre: Dr. Cesar Abel Burga C	isterna
DNI: 4786636	8			
Huella:				

MEH-FR-80 V.3 24/05/2023