

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A MIOMATOSIS
UTERINA EN PACIENTES ATENDIDAS EN EL
SERVICIO DE GINECOLOGÍA DEL HOSPITAL DE
VENTANILLA DURANTE EL PERIODO ENERO 2015 –
DICIEMBRE 2016**

TESIS

PRESENTADA POR BACHILLER

AVALOS CANTARO JHOSELYN NATHALY

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE

MÉDICO CIRUJANO

LIMA - PERÚ
2017

RESUMEN

Objetivo : Determinar los factores de riesgo asociados al desarrollo de Miomatosis Uterina en pacientes atendidas en el servicio de Ginecología del Hospital Ventanilla durante el periodo enero 2015 – diciembre 2016.

Material y Métodos: Tipo de estudio, analítico, observacional, retrospectivo, de casos y controles. La población estaba constituida por 80 mujeres según criterios de inclusión y exclusión establecidos distribuidos en dos grupos: los que presentaron factores de riesgo y los que no presentaron factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad.

Resultados: Se obtuvieron 4 tablas en la cual el 90% de las pacientes con miomatosis uterina fue añosa confiere un OR 11 [3,29 - 38,75] con un ($p < 0.05$). Sólo el 28,8% del total de pacientes tuvo antecedente familiar de miomatosis uterina confiere un OR 12,3 [3,26 - 46,62] con un ($p < 0.05$).

Discusión de resultados: La edad es un factor de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad, siendo las mujeres añosas el 90% de las pacientes con miomatosis uterina mayores de 35 años de edad, comparando con un estudio realizado en el Perú en el cual se utilizó una población de 188 pacientes, en el que se demostró que la edad más frecuente oscilo de 35 - 49 años que fue el (60%).

Conclusiones: La edad mayor a 35 años y contar con un antecedente familiar con la enfermedad demostraron ser factores de riesgo para miomatosis uterina condiciona un riesgo muestral de 4.44 el cual es estadísticamente significativo.

Palabras Clave: Miomatosis uterina, factores de riesgo