

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**OBESIDAD PREGESTACIONAL COMO FACTOR DE
SEVERIDAD DE LA PREECLAMPSIA EN EL
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA EN EL
AÑO 2016.**

TESIS

PRESENTADA POR BACHILLER

ANTHON YAKON BAGATULJ DE LA CRUZ

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
MÉDICO CIRUJANO**

LIMA – PERÚ

2017

RESUMEN

Objetivo: Determinar si la obesidad pregestacional es un factor de severidad de la preeclampsia en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza en el año 2016.

Material y Métodos: Estudio Analítico-Cohorte, retrospectivo, transversal, la muestra del estudio fueron 186 gestantes con preeclampsia, de las cuales se separó en dos grupos de estudio, con preeclampsia leve y preeclampsia severa, se realizó la revisión de historias clínicas y libro de admisión de emergencia de Obstetricia, se utilizó una ficha de recolección de datos validada por expertos, con el fin de evaluar su relación con la obesidad pregestacional.

Resultados: De 186 gestantes que se estudiaron con preeclampsia, 31 teniendo obesidad pregestacional (50%) y 22 no tenían obesidad (17.7%). El antecedente de preeclampsia con obesidad pregestacional con nuevo episodio de preeclampsia fue de 14.5%, y primigesta con obesidad pregestacional con preeclampsia severa se encontraron 24 (38.7%). La obesidad pregestacional con preeclampsia severa fue de 50% con un OR: 4.636, IC: 95% y una p: 0.000.

Conclusiones: Este estudio concluye que la obesidad pregestacional si es un factor de severidad de la preeclampsia teniendo 4.636 mayor riesgo de sufrirla que una gestante no obesa.

Palabras claves: Obesidad pregestacional, Preeclampsia, preeclampsia severa, factor de riesgo.