

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**FACTORES ASOCIADOS A ICTERICIA PATOLÓGICA
NEONATAL EN RECIEN NACIDOS A TÉRMINO DEL
SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL
HOSPITAL CARLOS LAN FRANCO LA HOZ
2016**

TESIS

**PRESENTADA POR BACHILLER
DIEGO ENRIQUE MALCA GRIMALDO**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
MÉDICO CIRUJANO**

**LIMA- PERÚ
2017**

RESUMEN

OBJETIVO: Determinar los Factores asociados a Ictericia patológica en recién nacidos a término atendidos en el servicio de Pediatría - del Hospital Carlos Lan Franco La Hoz en el periodo 2016.

MATERIAL Y MÉTODO: La presente investigación es de tipo observacional, comparativo, retrospectivo, transversal. La población fueron todos los neonatos nacido con el diagnóstico de ictericia un total de 350 cuyo criterio de inclusión ser atendido en el servicio de pediatría del Hospital Carlos Lan Franco La Hoz 2016 y exclusión que sean preterminos. Y se tomó como muestra a nacido a término con el diagnóstico de ictericia fueron 68 la cual fue por muestreo por conveniencia y no fue necesario el cálculo muestral. Se realizó análisis descriptivo de frecuencias y bivariados con el chi cuadrado para un p valor de 0.05 en la comparación de grupos de ictericia patológica y fisiológica.

RESULTADOS: se encontró que los factores asociados a ictericia patológica son: sexo: femenino ($p=000$), tipo de parto: distócico ($p=000$), el APGAR con valor normal ($p=000$), el bajo peso al nacer y el grupo sanguíneo O.

CONCLUSIÓN: Se concluyó que los factores asociados son el sexo al nacer ,el tipo de parto, el APGAR, el peso y el grupo sanguíneo; Se recomienda realizar estudios de caso control o de cohorte para determinar si estos son factores de riesgo.

PALABRAS CLAVES: Ictericia, neonato, hiperbilirrubinemia, a término.