

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**COMPLICACIONES POST OPERATORIAS EN
TÉCNICAS DE HERNIOPLASTIA INGUINAL CON
TENSIÓN VERSUS HERNIOPLASTIA INGUINAL SIN
TENSIÓN, HOSPITAL DE VITARTE, 2014 –2015**

TESIS

PRESENTADO POR EL BACHILLER

LUIS ALBERTO LOYOLA ALVA

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
MÉDICO CIRUJANO**

**LIMA – PERÚ
2017**

RESUMEN

Objetivo: Determinar las complicaciones postoperatorias de las técnicas de hernioplastia inguinales con tensión versus sin tensión en el hospital de Vitarte en el periodo 2014 –2015. **Metodología:** El tipo de estudio que se realizó fue observacional es decir: descriptivo y retrospectivo. La población de estudio fueron los pacientes postoperados de hernioplastia inguinal sin malla según las técnicas de a tensión McVay, Bassini y con malla según la técnica sin tensión Lichtenstein en el Hospital de Vitarte en el periodo 2014 –2015; se totalizó 149 pacientes. Se utilizó una ficha de registro de datos para consolidar los datos recogidos de historias clínicas de seguimiento del paciente. Después de procesarlos, se procedió a realizar los siguientes análisis estadísticos: Obtención de frecuencias y porcentajes, medias y desviación estándar, elaboración de tablas de doble entrada, significancia estadística con la prueba de Chi-cuadrado. **Resultados:** El tipo de hernias que se intervinieron con mayor frecuencia fueron las hernias inguinales directas que equivalen al 49% de los pacientes. El grupo promedio de edad corresponde a pacientes entre 60 y 70 años. No hubo predominio de complicaciones. Respecto al tipo de sexo que en el predominio las hernias inguinales fueron varones. **Conclusiones:** La hernioplastia con técnica sin tensión tipo Lichtenstien presenta menos complicaciones y corresponde al 82.6% del total de hernioplastias inguinales atendidas.

Palabras clave: Hernioplastia, complicaciones post quirúrgicas, técnicas con tensión, técnicas sin tensión.